

Servicio de Medicina Nuclear

PREPARACION DE PRUEBAS

Información para pacientes

SNOLL

(sentinel node occult lesion localization)

Información sobre la prueba diagnóstica

El SNOLL es el procedimiento de elección para localizar los ganglios axilares y marcar el tumor de la mama mediante una sola inyección, para que puedan ser extirpados en la cirugía.

Preparación para la prueba

- No se requiere ningún tipo de preparación especial para la prueba, salvo acudir en ayunas si se opera el mismo día.
- Si lo desea puede venir con un/a acompañante adulto/a que no esté embarazada.

Exploración

Se le inyectará un radiofármaco intratumoral.

Deberá esperar hasta dos horas para la adquisición de las imágenes gammagráficas para tratar de localizar el/los ganglio/s centinela.

El día de la cirugía el médico nuclear acudirá a quirófano para ayudar a localizar el/los ganglios de deben ser extirpados.

Precauciones

Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. El especialista le indicará si debe interrumpirla y por cuánto tiempo.

Contraindicaciones

Si está EMBARAZADA o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al personal del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.

Posibles efectos secundarios

Puede notar ligera molestia en los puntos de inyección.

El esparadrapo puede generar alguna reacción alérgica cutánea.

Precauciones en las horas posteriores a la prueba

Durante 24 horas después la inyección evitará el contacto próximo con embarazadas y niños menores de 13 años.

Aconsejamos beber abundante líquido y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.

SI TIENE CUALQUIER DUDA CONSULTE AL PERSONAL DE MEDICINA NUCLEAR