

Servicio de Medicina Nuclear

PREPARACION DE PRUEBAS

Información para pacientes

SPECT Cerebral Presináptico (DaTSCAN)

Información sobre la prueba diagnóstica

Consiste en la realización de un estudio cerebral para valorar alteraciones del movimiento.

Preparación para la prueba

BLOQUEO DEL TIROIDES

Tomará:

Perclorato potásico 400 mgr. (2 cápsulas) con agua, administrado entre 30 minutos y una hora antes de la inyección, que se le administrará en Medicina Nuclear.

Si lo desea puede venir con un/a acompañante mayor de 13 años y/o que no esté embarazada.

Exploración

Se inyecta un radiofármaco en el antebrazo por vía intravenosa.

Tiene que esperar de 3 a 4 horas a partir de la inyección para la realización

Efectos secundarios

- No produce dolor.
- Si tiene alergias conocidas al Yodo, consulte con su neurólogo.
- La radiación para el paciente es similar a la de una radiografía.
- Aconsejamos beber abundante líquido y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.

Precauciones

Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. El médico le indicará si debe interrumpirla y por cuanto tiempo.

Si padece claustrofobia comuníquelo al personal antes de comenzar el estudio.

Durante las 24 horas posteriores a la inyección, deberá evitar el contacto próximo con mujeres embarazadas y niños menores de 13 años.

Aconsejamos beber abundante líquido y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.

Contraindicaciones

Si está EMBARAZADA o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al médico del Servicio de Medicina Nuclear, antes de la inyección

SI TIENE CUALQUIER DUDA CONSULTE AL PERSONAL DE MEDICINA NUCLEAR