

Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo

PREPARACIÓN DE PRUEBAS

Información para pacientes sobre la preparación para


CIRUGIA COLORRECTAL

Para una correcta preparación de la cirugía colorrectal deberá seguir las siguientes indicaciones:

.Tomará dieta pobre en residuos.

<p>48 HORAS ANTES DE LA CIRUGÍA</p>	<p>Pastas, caldos, carne, pescado a la plancha o hervido, quesos duros, zumos filtrados, infusiones: té, café bebidas sin burbujas</p>
<p>NO PUEDE TOMAR</p>	<p>Ensaladas, verduras y legumbres, fruta, arroz, patatas, carnes y pescados en salsa, embutidos, grasas, pasteles, bebidas con gas, leche y productos lácteos</p>









.Tomará dieta líquida.

<p>24 HORAS ANTES DE LA CIRUGÍA</p>	<p>Agua, caldos filtrados, zumos colados, infusiones: té, café y bebidas sin burbujas</p> <div style="text-align: center;">  </div>
--	---

NOTA: Si su médico se lo ha prescrito tomará además los preparados **SUGARMIX** (se le proporcionarán en la consulta junto a las instrucciones de cómo tomarlo).

EL DIA ANTERIOR A LA CIRUGIA CÓMO TOMAR EL PREPARADO

Preparacion de los sobres PLEINVUE®

Sobre Dosis 1	 <p>Extraer de la bolsa el sobre DOSIS 1 de PLEINVUE®.</p>	 <p>Añadir el contenido del sobre en una jarra con MEDIO litro de agua, REMOVER 8 minutos</p>
	<p> a las 16.00 horas.</p> <p>Una vez preparado el medio litro de PLEINVUE®, beber la solución hasta vaciar la jarra.</p> <p>A continuación, beberá otro medio litro líquido claro: agua, zumo filtrado, caldo (colado y sin grasa) o café solo (sin leche).</p> <p>Para una mejor tolerancia, se puede beber la solución Pleinvue alternando con el líquido claro. (El proceso le llevará 1 hora).</p> 	
Dosis 2 Sobres (A+B)	 <p>Añadir el contenido de los sobres A+B en una jarra con MEDIO LITRO de AGUA FRIA (de nevera)</p>	 <p>Remover</p>
	<p> a las 19.00 horas.</p> <p>Cuando tome la DOSIS 2 es importante beber DESPACIO y a SORBOS (en 1 hora) hasta vaciar la jarra.</p> <p>A continuación, beberá otro MEDIO LITRO de líquido claro puede ser: agua, zumo filtrado, caldo (colado y sin grasa) o café solo (sin leche).</p> <p>Se puede beber la solución Pleinvue alternando con el líquido claro.</p> 	

Es recomendable **BEBER TODO LIQUIDO CLARO QUE SE QUIERA**, después de la **DOSIS 2 hasta 8 horas ANTES DE LA PRUEBA**, que vendrá en **AYUNO ABSOLUTO**.