

Servicio de Medicina Nuclear

PREPARACION DE PRUEBAS

Información para pacientes

DetECCIÓN de ganglio centinela en cáncer de: MAMA- ENDOMETRIO- CÉRVIX

Información sobre la prueba diagnóstica

La biopsia selectiva del ganglio centinela es el procedimiento de elección para localizar el drenaje ganglionar y decidir qué ganglios deben ser extirpados en la cirugía de su tumor ginecológico.

Preparación para la prueba

- No se requiere ningún tipo de preparación especial para la prueba, salvo acudir en ayunas si se opera el mismo día.
- Si lo desea puede venir con un/a acompañante adulto/a que no esté embarazada.

Exploración

- Se le inyectará un radiofármaco por vía intradérmica alrededor del tumor.
- Deberá esperar unas dos horas para la adquisición de las imágenes gammagráficas para tratar de localizar el/los ganglio/s centinela.
- El día de la cirugía el médico nuclear acudirá a quirófano para ayudar a localizar el/los ganglios que deben ser extirpados.

Precauciones

Las mujeres en periodo de lactancia deberán advertirlo antes de la inyección. El especialista le indicará si debe interrumpirla y por cuánto tiempo.

Contraindicaciones

Si está EMBARAZADA o cree que pudiera estarlo, deberá advertirlo al personal del Servicio de Medicina Nuclear antes de la inyección.

Posibles efectos secundarios

Puede notar ligera molestia en los puntos de inyección.
Los apósitos pueden generar reacciones cutáneas locales.

Precauciones en las horas posteriores a la prueba

Durante 24 horas después la inyección evitará el contacto próximo con embarazadas y niños menores de 13 años.

Aconsejamos beber abundante líquido y orinar con frecuencia en las horas posteriores a la realización de la prueba.

SI TIENE CUALQUIER DUDA CONSULTE AL PERSONAL DE MEDICINA NUCLEAR

Hospital Clínico San Carlos

Calle Prof. Martín Lagos s/n 28040 Madrid

Tel.: 91 330 30 00

www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos