

Servicio de obstetricia y ginecología


PREPARACION DE PRUEBAS

Información para pacientes

CONIZACION CERVICAL AMBULATORIA

¿QUÉ ES LA CONIZACIÓN CERVICAL?


El término conización significa la extirpación en forma “conica” de la parte externa del cuello del útero o exocérvix (base del cono) y una parte interna correspondiente al canal o endocérvix (vértice del cono)



La conización es indolora ya que para su realización se administra anestesia local en el propio cuello del útero. La única molestia durante la intervención puede estar causada por el separador vaginal necesario para poder ver bien el cuello. Se realiza de manera ambulatoria, por lo que no es necesario el ingreso.

INDICACIÓN

La conización cervical se realiza a mujeres a las que se ha diagnosticado una lesión precancerosa o premaligna en el cuello del útero. Estas lesiones aparecen como consecuencia de una infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH) que se adquiere al mantener relaciones sexuales.



PROCEDIMIENTO

■ ANTES DE LA CONIZACIÓN

- Realizar un estudio preoperatorio básico (Analítica de sangre)
- Informar al médico si presenta signos inflamatorios que indiquen infección vulvo-vaginal.
- **ACUDIRÁ ACOMPAÑADA**
- **NO** es necesario acudir en **AYUNAS**.

▪ **DESPUÉS DE LA CONIZACION**

- Reposo relativo, especialmente los 2 primeros días. Posteriormente limitar la actividad física vigorosa durante los 10 días siguientes.
- Evitar sumergirse en agua o realizar duchas vaginales o usar tampones vaginales las primeras 3-4 semanas.
- Evitar tener relaciones sexuales coitales las primeras 4 semanas tras el tratamiento.
- Es normal el sangrado vaginal escaso o moderado (inferior a la menstruación) o la pérdida de flujo rosado u oscuro en cantidad variable durante los días posteriores al tratamiento.
- Debes consultar a tu médico si presentas sangrado abundante (superior a la menstruación) que no cede con reposo, o flujo maloliente y muy abundante. Otros motivos de consulta deben ser dolor abdominal persistente o fiebre.
- Acudirá a su Centro de Atención Primaria para vacunación frente al Virus Papiloma Humano si no esta previamente vacunada, de acuerdo al Calendario de Vacunación de Grupo de Riesgo vigente.

Contacto y Recursos

Servicio de Ginecología y Obstetricia
UNIDAD GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA



Acceso Puerta G- Planta 5ª Ala Norte - Sala 5004

 91 330 30 00 extensión 484956

www.aepcc.org/conización-cervical/

