

Servicio de Urología

PREPARACIÓN DE PRUEBAS

Información para pacientes

COLOCACIÓN CATETER DOBLE J(JJ) PIELOGRAFIA ASCENDENTE

Información sobre la prueba

Consiste en la colocación de un catéter que permite el paso de orina (cáteter Doble J (JJ) . Para poder identificar la vía urinaria correctamente utilizamos contraste yodado (pielografía ascendente). La prueba puede realizarse con fines diagnósticos (pielografía) o terapéuticos (colocación de catéter)

El procedimiento se realiza bajo sedación y a través de la uretra. No precisa la realización de incisiones. Aunque es un procedimiento mínimamente invasivo no está exento de molestias y complicaciones.

Ponga en conocimiento de su médico TODO el tratamiento que toma de forma habitual o si tiene alguna alergia o intolerancia farmacológica.

PREPARACIÓN

- **NO COMER NI BEBER nada en las 6 horas ANTES** al procedimiento.
- **Si tuviera que tomar algún medicamento, podrá hacerlo con un sorbo de agua.**
- **DEBE ACUDIR ACOMPAÑADO.**
- Acuda con ropa cómoda y que sea fácil de desvestir.
- **MEDICACIÓN** que debe tomar:
PRIMER sobre de **Fosfomicina 3gr.**(Monurol®) la **NOCHE ANTERIOR** al procedimiento.

El urólogo que realice la prueba le indicará si es necesario un segundo sobre a las 24h. En caso de alergia a comuníquelo para administrar otro antibiótico.

- No precisa suspender su tratamiento habitual salvo que se así se lo haya recomendado específicamente el médico en la consulta.
- En caso de alergia su médico lo sustituirá por otro antibiótico alternativo.
- En caso de tener tratamiento con anticoagulación se le avisará para modificar la medicación
- Debe aportar, si fuera necesario, el Consentimiento Informado firmado.

El incumplimiento de las indicaciones previas puede conllevar la suspensión de procedimiento.

DESPUES DEL PROCEDIMIENTO

- Tras la realización de la prueba permanecerá en la sala de recuperación hasta su completa recuperación.
- Evite realizar esfuerzos o ejercicio físico intenso tras la colocación del catéter.
- Efectos secundarios esperables (son muy habituales y no suponen un mal funcionamiento del catéter):
 - Sangrado ocasional sobre todo con el movimiento o el esfuerzo.
 - Aumento de frecuencia miccional, escozor, urgencia miccional.
 - Dolor lumbar (irradiado a riñón) sobre todo con la micción.

Contacto y Recursos

Para cualquier duda o consulta puede llamar a:

Consultas de Urología ☎ 91 704 38 78

Horario de 9 a 14 horas

Hospital Clínico San Carlos

Calle Prof. Martín Lagos s/n 28040 Madrid

Tel.: 91 330 30 00

www.comunidad.madrid/hospital/clinicosanCarlos

SERVICIO DE UROLOGIA Colocación Catéter Doble J(JJ) Pielografía ascendente

PP-URO-011-2023 Versión 2 Abril 2026

REVISION 2029