

## POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Los primeros días posteriores a la instilación pueden aparecer algunos de estos **efectos secundarios**:

- Orinar con más frecuencia y/o con dolor y escozor.
- Orina de color rosado.
- Síntomas parecidos a una gripe (fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular).

**CONSULTE A SU URÓLOGO/A si las molestias persisten o le surge alguna duda.**

**CONSULTA Tumor Vesical**  
3ª NORTE – SALA 3002  
Tel.: 917043871

**CONSULTA Enfermería Planta**  
BAJA SUR – SALA B030  
Tel.: 917043878

HORARIO : 8 a 13 horas de Lunes a Viernes

## ACUDIR A URGENCIAS SI :

- Pícor, descamación y/o erupciones cutáneas.
- Molestias intensas más de 2 días.
- Presenta fiebre alta (más de 38°C)
- Aparición de sangre en la orina con coágulos.



Hospital Clínico San Carlos  
C/Prof. Martín Lagos, s/n  
28040 Madrid

[www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos](http://www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos)

Versión 1  
Mayo 2021  
Aprobado por el CTCIL

Información para  
pacientes y familiares

# Instilación vesical

**Documento Informativo**  
Hospital Clínico San Carlos  
Servicio de Urología

 **Hospital Clínico  
San Carlos**

## Instilación vesical

### ¿Que es la instilación vesical ?

La instilación vesical es un procedimiento mediante el cual se administra medicación en la vejiga a través de una sonda de pequeño calibre que se retirará inmediatamente después.

### ¿Para que se administran estos fármacos?

Tras la realización de una resección transuretral (RTU) del tumor y para evitar que reaparezca la enfermedad, su médico le ha prescrito un tratamiento endovesical o “lavado vesical” introduciendo un medicamento en el interior de la vejiga.

El tratamiento se lleva a cabo en las consultas del Servicio de Urología (planta Baja Sur – Sala B030)




## Recomendaciones

### ... antes de la instilación

Disminuya al máximo el consumo de líquidos.

### ... después de la instilación

- Retener la medicación durante 2 horas.
- No beba en exceso durante esas 2 horas.
- Debe tumbarse y **cambiar de postura** cada 15 minutos, para que la medicación se distribuya bien por toda la vejiga.



### PASADAS LAS DOS HORAS ...

- **BEBER ABUNDANTE** líquido para orinar frecuentemente. De esta manera se elimina lo antes posible el medicamento.
- Durante las **6 horas** siguientes deberá orinar **en el baño sentado** para evitar salpicaduras. Seguidamente verterá un chorro de lejía tras cada micción.
- Lavarse las manos y los genitales después de orinar.
- Es conveniente **no tener relaciones sexuales las primeras 48 horas**. Se aconseja utilizar preservativo durante el tratamiento.