

Servicio de Oncología Médica

INFORMACIÓN para pacientes

Programa de Retirada de Elastómero con Quimioterapia en domicilio para pacientes con RESERVORIO SUBCUTÁNEO

Información

El elastómero es un dispositivo sanitario a través del cual se le infundirá la quimioterapia prescrita por el facultativo de manera continua en su domicilio, evitando tener que ingresar

La quimioterapia circula desde el balón, a través del catéter hacia el interior del torrente sanguíneo. Cuando esto ocurre, el balón se desinfla (se hace más pequeño).

La retirada del elastómero de quimioterapia en el domicilio del paciente es una técnica fácil, para la cual se le proporcionará la formación e información necesaria.


Le indicaremos la fecha exacta de la retirada, cuando el balón está desinflado por completo. La principal ventaja es evitar el desplazamiento al hospital.



Material

Dispondrá de un Kit de retirada con todo el material necesario:

- 1 Jeringa 5cc
- 1 aguja intravenosa
- 1 vial de heparina diluida (3cc)
- Apósito con gasa



Procedimiento

A continuación le detallamos **los pasos a seguir para la retirada del elastómero**.

1. Lávese las manos con agua y jabón antes y después del procedimiento.
2. Disponga el material que le hemos proporcionado sobre una superficie limpia (mesa o encimera).
3. Coloque la aguja en la jeringa, con el vial hacia abajo, insértela y extraiga todo el contenido de la heparina (3cc).
4. Desconecte el elastómero del tapón de seguridad (bioconector). Consiste en girar y desenroscar.
5. Retire la aguja de la jeringa e **inyecte** la heparina preparada a través del tapón bioconector.
6. Cierre la pinza.
7. Retire el apósito y visualice la aguja "gripper" como le hemos enseñado.
8. Retire la aguja "gripper"
9. Por último, coloque el apósito protector en dicha zona.



No deseche a la basura el elastómero ni el material utilizado. Introduzca en una bolsa hermética y en su próxima visita entréguelo en nuestro servicio

Contacte con nosotros en caso de:

- El elastómero no se vacía o se vacía antes de lo que debería según nuestras instrucciones.
- Observa líquido alrededor de la piel o en apósito que rodea la salida del catéter.
- Si tiene dolor, enrojecimiento, fiebre o inflamación alrededor del sitio de salida del catéter

En la Consulta de Enfermería y en el Hospital de Día de Oncología estamos a su disposición. Le proporcionaremos la formación y el material necesario para la retirada del elastómero.



Contacto y Recursos

Servicio de Oncología Médica

Teléfonos: 91 704 47 81 / 91 704 48 43 (consultas)
91 704 47 97 (Hospital de día oncológico)

Horario de consultas: Lunes a Viernes (laborables)
Horario de 8 a 15 horas.

Horario de Hospital de Día Oncológico:

Lunes a Viernes (laborables): Horario de 8 a 20:30 horas
Sábados: Horario de 9 a 13 horas

Hospital Clínico San Carlos

Calle Prof. Martín Lagos s/n 28040 Madrid

Tel.: 91 330 30 00

www.comunidad.madrid/hospital/clinicosancarlos