

HIPEC

Quimioterapia intraperitoneal hipertérmica.

Se administra en quirófano, tras la CITORREDUCCIÓN.

El día de antes de la cirugía:

- **DIETA LIQUIDA BAJA EN RESIDUOS** hasta las 00:00h. Después, dieta absoluta.
- Confirmar **PREPARACIÓN INTESTINAL** con cirugía: Citrafleet sobres (13h y 19h) o Enemas (21h y 7h).
- Puede canalizarse el Port-à-cath previo a la cirugía para la extracción de confirmatorio de grupo (turno de mañana).
- **PESAR Y TALLAR** en turno de tarde.
- **MARCAJE DE ESTOMA*** en turno de tarde: bilateral, tanto derecho como izquierdo.
- Suero glucosalino pautado a partir de turno de tarde, salvo en diabéticos que se administrará la sueroterapia de protocolo de diabético, con sus controles de glucemia pertinentes.
- Heparina según prescripción a las 21h.
- **RASURAR ABDOMEN** en turno de noche (si presenta vello).

El día de la cirugía:

- Aseo con esponjas de clorhexidina y enjuague bucal a las 07:00h.
- Medias de compresión a las 07:00h.

Tras cirugía:

- Suele volver a las 24 horas a la planta.
- Entregar **INCENTIVADOR RESPIRATORIO** e instruir en su uso.
- **FAJA ABDOMINAL.**
- Levantar precozmente esa misma tarde del 1ºDPO, si tolera. Deambulación precoz cuando tolere.
- Valoración del dolor controlándolo con analgesia pautada. Además, estos pacientes tienen catéter epidural (PCA epidural en curso + bolos a demanda). Tener bolsa de PCA de repuesto en nevera (las prepara farmacia, se piden en turno de tarde).
- Valoración de drenajes, avisando a cirugía para cualquier incidencia de débito inapropiado.
- Progresión de dieta por parte de cirugía hasta dieta de fácil digestión.