

**RECOMENDACIONES TRAS UNA
TRANSFERENCIA EMBRIONARIA**



Dña.NHC

ha sido sometida el día a una transferencia de embriones/blastocisto.

A continuación le facilitamos las recomendaciones que debe seguir:

1. Debe mantener reposo relativo esta tarde.
2. No debe mantener relaciones sexuales en siete días. En todo caso, las seguirá evitando si le produjesen dolor o molestias.
3. Continuará tomando el suplemento de ácido fólico hasta nueva orden.
4. Deberá proseguir la administración de **Progeffik o Utrogestan 200 mg: 1 comprimido por vía vaginal cada 8 horas**. Mantendrá esta medicación hasta su próxima cita. No la suspenderá aunque sangrase.
5. Si tuviese fuerte dolor abdominal, orina escasa, vómitos o diarrea, se pondrá en contacto con esta consulta (916219536) o acudirá a las Urgencias de este hospital.
6. Acudirá al control de enfermería del Hospital de día Médico para extracción de muestra de sangre el día de 8:30 a 10 horas (**no es preciso que esté en ayunas**). El resultado nos indicará si Ud. está embarazada o no. Se lo comunicaremos telefónicamente ese mismo día a última hora de la mañana.
7. Como se les indicó el día de la punción folicular si, tras la transferencia embrionaria quedaran embriones sobrantes y, tras el periodo oportuno de cultivo se vitrificara alguno de ellos, se les enviará desde laboratorio de embriología, una carta notificando dicho hecho, y el número de embriones criopreservados del ciclo actual.

Dr/a.....

RECORDAMOS QUE ES IMPRESCINDIBLE FACILITAR SU NUMERO DE HISTORIA CLÍNICA PARA CUALQUIER CONSULTA CON LA UNIDAD

Código	GER-D-004	Elaborado: Dra. Berta M ^a Martín Cabrejas Facultativo Especialista de Área	Revisado: Dr. Martín Caballero Jefe de Unidad de Reproducción Humana	Visto Bueno: Comité Técnico de Coordinación de información
Versión	1.0			
Fecha vigor	24/04/2019			
Página	1 de 1			