

**RECOMENDACIONES TRAS REALIZACIÓN DE
TRANSFERENCIA DIFERIDA**

Dña.NHC

ha sido sometida el día a una transferencia deblastocistos.

A continuación le facilitamos las recomendaciones a seguir:

1. Debe mantener reposo relativo esta tarde.
2. No debe mantener relaciones sexuales en siete días. En todo caso, las seguirá evitando si le produjesen dolor o molestias.
3. Continuará tomando el suplemento de ácido fólico hasta nueva orden.
4. Deberá proseguir la administración de **Progeffik o Utrogestan 200 mg: 2 comprimidos vía vaginal cada 12 horas**. Mantendrá esta medicación hasta su próxima cita. No la suspenderá aunque sangrase. Es una medicación no financiada por el SNS.

Deberá proseguir también tratamiento con los parches de estrógenos que tenga indicado hasta conocer si ha habido gestación.

- 2 parches de Evopad 75 mg/48 horas
- 2 parches Estraderm 75 mg/48
- Otros:.....

5. Si tuviese fuerte dolor abdominal, orina escasa, vómitos o diarrea, se pondrá en contacto con esta consulta 916219536 (facilitará su nº de historia clínica) o acudirá a las Urgencias del hospital.

6. Acudirá al control de enfermería del Hospital de Día Médico para extracción de muestra de sangre el día **de 8:30 a 10 horas** (no es preciso que esté en ayunas). El resultado nos indicará si Ud. está embarazada o no. Se lo comunicaremos telefónicamente a última hora esa misma mañana.

Dr/a.

Código	GER-D-004	Elaborado:	Revisado:	Visto Bueno:
Versión	1.0	Dra. Berta Martín Cabrejas	Dr. Martín Caballero	Comité Técnico de
Fecha vigor	26/04/2019	Facultativo Especialista de	Jefe de Unidad de	Coordinación de información
Página	1 de 1	Area	Reproducción Humana	