

Relación de ensayos clínicos y estudios activos mayo 2025

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
AbbVie Farmacéutica SLU	Registro no intervencionista de larga duración para evaluar la seguridad y la efectividad de HUMIRA® (adalimumab) en pacientes con colitis ulcerosa (CU) de actividad moderada a grave (LEGACY).	Digestivo
Genzyme Corporation	Protocolo del Registro de Gaucher	Hematología
ZIMMER GmbH	Persona Partial Knee Clinical Outcomes Study	Traumatología
Unidad del Dolor	Valoración de la incidencia de insomnio, calidad de vida y efectividad del tratamiento con Tapentadol liberación prolongada (LP) en pacientes con dolor crónico intenso	Unidad del Dolor
Boston Biomedical Inc	Estudio de Fase III de BBI-608 en combinación con 5-fluorouracilo, ácido folínico e iri0tecán (FOLFIRI) en pacientes adultos con cáncer colorrectal (CCR) metastásico previamente tratado.	Oncología
Janssen Biotech, Inc	Registro de exposición a largo plazo prospectivo y observacional de pacientes adultos con colitis ulcerosa de moderada a grave (OPAL)	Digestivo
F. Hoffmann-La Roche Ltd	Estudio en fase II de 52 semanas, aleatorizado, con doble enmascaramiento y controlado con placebo, para evaluar la eficacia de R07046015/Prasinezumab (PRX002) intravenoso en participantes con enfermedad de Parkinson incipiente, con una extensión con todos los participantes en tratamiento de 6 años con enmascaramiento de 52 semanas (PASADENA)	Neurología
Sanofi Gezyme	Subregistro prospectivo, multicéntrico y observacional de seguridad postautorización para caracterizar el perfil de seguridad a largo plazo del uso comercial de eliglustat (Cerdelga®) en pacientes adultos con enfermedad de Gaucher	Hematología
F. Hoffmann-La Roche Ltd	Estudio en fase III, multicéntrico, aleatorizado y abierto para comparar atezolizumab (anticuerpo anti-pd-l1) en combinación con quimioterapia adyuvante basada en antraciclina/taxano frente a solo quimioterapia en pacientes con cáncer de mama triple negativo operable	Oncología

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
GEICAM	Estudio de Largo Seguimiento de Pacientes con Cáncer de Mama Incluidos en Estudios en Estadios Precoces del Grupo GEICAM. LARGO SEGUIMIENTO	Oncología
Janssen Cilag SA	A Phase 3 Study Comparing Daratumumab, VELCADE (bortezomib), Lenalidomide, and Dexamethasone (D-VRd) with VELCADE, Lenalidomide, and Dexamethasone (VRd) in Subjects with Untreated Multiple Myeloma and for Whom Hematopoietic Stem Cell Transplant is Not Planned as Initial Therapy	Hematología
LEO Pharma	Ensayo de extensión a largo plazo, multicéntrico, abierto y de un solo brazo, para evaluar la seguridad y eficacia de tralokinumab en pacientes con dermatitis atópica que participaron previamente en ensayos clínicos con tralokinumab	Dermatología
BRISTOL-MYERS SA	Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y un comparador activo para evaluar la eficacia y seguridad de BMS-986165 en pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave	Dermatología
Sanofi	Implantación de un programa de cribado bioquímico y genético de hipercolesterolemia familiar. Colaboración entre el laboratorio clínico y las unidades de riesgo cardiovascular en la consecución de objetivos terapéuticos lipídicos. PROYECTO ARIAN	Medicina Interna
Sanofi	Implantación de un programa de cribado bioquímico y genético de hipercolesterolemia familiar. Colaboración entre el laboratorio clínico y las unidades de riesgo cardiovascular en la consecución de objetivos terapéuticos lipídicos. PROYECTO ARIAN	Area de Laboratorio
PFIZER INC	Estudio de fase 3 multicéntrico aleatorizado, con grupos paralelos, con doble enmascaramiento y doble simulación, controlado con placebo para investigar la eficacia y la seguridad de PF04965842 y dipilumab en comparación con un placebo en sujetos adultos con dermatitis atópica de moderada a intensa que reciben tratamiento tópico de fondo	Dermatología

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
Asociación Española de Cirujanos	Utilidad de las mallas en la prevención de la hernia incisional en pacientes sometidos a cirugía oncológica citorreductora más HIPEC. Ensayo clínico de bajo nivel de intervención, prospectivo, multicéntrico y aleatorizado	Cirugía
GETECCU	Seguridad de los tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal durante el embarazo y la lactancia: impacto en las madres y en los niños (registro DUMBO)	Digestivo
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Estudio con enmascaramiento doble, controlado con placebo y aleatorizado de cemiplimab complementario comparado con placebo tras tratamiento quirúrgico y radioterapia en pacientes con carcinoma epidermoide cutáneo de alto riesgo	Dermatología
LILLY SA	Estudio en fase 3 aleatorizado, abierto, de abemaciclib en combinación con tratamiento endocrino adyuvante estándar frente a monoterapia con tratamiento endocrino adyuvante estándar, en pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales, de alto riesgo, con afectación ganglionar, receptores hormonales positivos, HER2 negativo	Oncología
Janssen Cilag SA	Estudio aleatorizado para evaluar la seguridad y la eficacia de JNJ-70033093 (BMS-986177) por vía oral frente a enoxaparina en sujetos sometidos a una intervención quirúrgica programada de reemplazo total de rodilla	Traumatología
Sanofi-Aventis	Proyecto de Sensibilización y Diagnóstico de la enfermedad de Pompe	Neurología
Shire Pharmaceutical Development Ltd	Estudio en fase IV de 2 partes, multicéntrico, compuesto de una evaluación de optimización de la dosis de 1 año aleatorizada, doble ciego, de grupos paralelos, controlada con placebo y comparador activo, seguida de una evaluación abierta de 1 año para evaluar la seguridad y la eficacia de clorhidrato de guanfacina de liberación prolongada (SPD503) en niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad con trastorno por déficit de atención con hiperactividad	Psiquiatría

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
AUSTRIAN BREAST	PALLAS: (PALbociclibCoLLaborativeAdjuvantStudy): Ensayo de fase III aleatorizado de palbociclib con tratamiento endocrino adyuvante estándar frente a monoterapia con tratamiento endocrino adyuvante estándar en cáncer de mama precoz con receptores hormonales	Oncología
Centogene AG	Estudio internacional sobre la enfermedad de Parkinson de Rostock	Neurología
NOVARTIS FARMACEUTICA SA	Estudio de extensión multicéntrico, doble ciego y abierto para evaluar la eficacia y seguridad de ligelizumab como retratamiento, terapia autoadministrada y monoterapia en pacientes con urticaria crónica espontánea que han completado los estudios CQGE031C2302, CQGE031C2303, CQGE031C2202 o CQGE031C1301	Dermatología
NOVARTIS FARMACEUTICA SA	Estudio de extensión multicéntrico, doble ciego y abierto para evaluar la eficacia y seguridad de ligelizumab como retratamiento, terapia autoadministrada y monoterapia en pacientes con urticaria crónica espontánea que han completado los estudios CQGE031C2302, CQGE031C2303, CQGE031C2202 o CQGE031C1301	Alergia
Exelixis, Inc	Estudio de fase 3, aleatorizado, abierto, controlado, de cabozantinib (XL184) en combinación con atezolizumab frente a una segunda terapia hormonal novedosa (THN) en pacientes con cáncer de próstata metastásico y resistente a la castración	Urología
GEIS	Estudio retrospectivo en pacientes con tumores del estroma gastrointestinal (GIST) primarios no metastásicos potencialmente resecables o localmente avanzados solo resecables mediante cirugía mutilante sometidos a terapia neoadyuvante con inhibidores de tirosina quinasa y posterior cirugía	Oncología
	Registro del Grupo Español de Cirugía Oncológica peritoneal: REGECOP	Cirugía
NOVARTIS FARMACEUTICA SA	Estudio fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de LEE011 o placebo en combinación con tamoxifeno y goserelina o de un inhibidor de la aromatasas no esteroideo (IANE) y goserelina para el tratamiento de mujeres premenopáusicas con cáncer	Oncología

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
Bayer Healthcare AG	Estudio abierto, de un solo brazo, de continuación de tratamiento con darolutamida a pacientes incluidos previamente en estudios promovidos por Bayer	Urología
GALDERMA INTERNACIONAL	Estudio prospectivo, multicéntrico y a largo plazo para evaluar la seguridad y la eficacia de Nemolizumab (CD14152) en sujetos con dermatitis atópica de moderada a grave	Dermatología
F. Hoffmann-La Roche Ltd	Estudio Fase II multicéntrico, aleatorizado, abierto, con dos brazos de tratamiento neoadyuvante, para evaluar la eficacia, seguridad y farmacocinética de GDC-9545 más palbociclib comparado con anastrozol más palbociclib en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama precoz no tratado, con receptor de estrógeno-positivo y Her2-negativo	Oncología
GEIS	Estudio sobre el impacto en el pronóstico y la calidad de vida del diagnóstico anatomopatológico centralizado de sarcomas de partes blandas en el estado español	Anatomía Patológica
ISCIH	Estudio Prevención y tratamiento con Calcifediol del síndrome respiratorio agudo (SARS) inducido por Coronavirus COVID-19	Urgencias
Bayer Consumer Care AG	Estudio en fase III, aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego de darolutamida además de tratamiento de privación de andrógenos (TPA) frente a placebo más TPA en hombres con cáncer de próstata metastásico sensible a las hormonas (CPMSH)	Urología
F. Hoffmann-La Roche Ltd	Estudio en fase IIB, aleatorizado, con doble enmascaramiento, comparativo con placebo y multicéntrico, para evaluar la eficacia y la seguridad de prasinezumab intravenoso en participantes con enfermedad de parkinson incipiente	Neurología
Daiichi Sankyo Inc	Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, abierto y controlado de trastuzumab deruxtecán (t-dxd) frente a trastuzumab emtansina (t-dm1) en pacientes con cáncer de mama primario her2 positivo de alto riesgo que presentan enfermedad invasiva residual en mama o en ganglios linfáticos axilares tras el tratamiento neoadyuvante (DESTINY-Breast05)	Oncología

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
	Profilaxis de hemorragia diferida con PURASTAT® tras resección endoscópica mucosa de lesiones colorrectales de gran tamaño en pacientes con alto riesgo de sangrado. Registro prospectivo	Digestivo
Inmunotek,S.L	Ensayo Clínico de eficacia y seguridad, prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego controlado con placebo, con inmunoterapia subcutánea en pacientes con rinitis/rinoconjuntivitis con o sin asma de leve a moderada sensibilizados a gramíneas y cupresáceas	Alergia
	Analgesia postoperatoria mediante el bloqueo bilateral del plano del músculo erector espinal en cirugía de columna lumbar: estudio prospectivo, aleatorizado y doble ciego	Anestesia
SEOM	Estudio AGAMENON: Registro Español de Cáncer Esofagogástrico	Oncología
Takeda Farmacéutica España S.A.	Uso del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y del aprendizaje automático (AA) para la identificación de pacientes con enfermedad de Crohn (EC) y fístulas perianales complejas (FPC) y su caracterización en términos de características clínicas y demográficas. Un estudio multicentro, retrospectivo y basado en el PLN. Estudio INTUITION-CPF	Digestivo
	Analgesia incisional comparada con analgesia epidural en cirugía abdominal abierta. Estudio prospectivo y aleatorizado	Anestesia
NOVARTIS FARMACEUTICA SA	Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisiran en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT).	Medicina Interna
Inventiva S.A	Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo de lanifibranor en pacientes adultos con esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) sin cirrosis y estadio de fibrosis hepática grado 2 (F2)/grado 3 (F3)	Digestivo
Fundación SEIMC-GESIDA	DTG / 3TC frente a BIC / FTC / TAF como terapia de mantenimiento en personas que viven con VIH: ensayo clínico abierto y aleatorizado	Enfermedades Infecciosas

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
GlaxoSmithKline SA	Estudio de fase 2, aleatorizado, en paralelo y abierto para investigar la seguridad, eficacia y farmacocinética de varios regímenes de dosificación de belantamab mafodotín (GSK2857916) en monoterapia en participantes con mieloma múltiple en recaída o refractario (DREAMM-14)	Hematología
Hospital de Fuenlabrada	Ensayo Clínico Multicéntrico Fase IV para evaluar la eficacia de la quimioterapia intraoperatoria hipertérmica (HIPEC) con Mitomicina-C tras la citorreducción quirúrgica completa en pacientes con Metástasis Peritoneales de Cáncer de Colon.	Cirugía
ROXALL Medicina España S.A.	Estudio observacional prospectivo para evaluar la seguridad y protección frente a repicadura del tratamiento con Allergovac® Himenópteros en pacientes sensibilizados a este veneno	Alergia
GEICAM	Estudio Observacional no posautorización (no-EPA) Estudio prospectivo de registro de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado no resecable o metastásico (CMM). Estudio RegistEM	Oncología
GlaxoSmithKline SA	Estudio de 52 semanas de duración, aleatorizado, doble ciego, con doble simulación, de grupos paralelos, multicéntrico, de no inferioridad, para evaluar la tasa de exacerbación, las mediciones adicionales de control del asma y la seguridad en participantes adultos y adolescentes con asma grave con fenotipo eosinofílico tratados con GSK3511294 en comparación con mepolizumab o benralizumab	Alergia
UNICANCER	ALBAN: un ensayo de fase III, aleatorizado y abierto, que evalúa la eficacia del atezolizumab administrado de forma concomitante con instilaciones vesicales de BCG (Bacilo de Calmette-Guérin) durante un año en pacientes con cáncer de vejiga sin invasión muscular con alto riesgo de recidiva y que no han sido tratados previamente con BCG	Urología

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
F. Hoffmann-La Roche Ltd	A phase III, randomized, open-label, multicenter study evaluating the efficacy and safety of adjuvant Giredestrant compared with physician's choice of adjuvant endocrine monotherapy in patients with estrogen receptor-positive, HER2-negative early breast cancer	Oncología
Fundación SEIMC-GESIDA	Ensayo clínico fase IV, aleatorizado, multicéntrico y doble ciego diseñado para evaluar la seguridad y la conveniencia del cambio de DTG/3TC por BIC/FTC/TAF en personas con VIH, buen control virológico y vulnerabilidades neuropsiquiátricas: Estudio MIND	Enfermedades Infecciosas
Sociedad Española de Neonatología	Proyecto de seguimiento a largo plazo prematuro moderado y tardío mediante un método de cribado de riesgo de anomalías en el neurodesarrollo	Pediatría
Camurus AB	Ensayo en fase 3 aleatorizado, multicéntrico, abierto, comparativo con tratamiento activo para evaluar la eficacia y seguridad de octreotida (CAM2029) subcutánea de liberación prolongada frente a octreotida LP o lanreotida ATG en pacientes con tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos.	Oncología
	Estudio prospectivo multicéntrico observacional sobre las complicaciones asociadas a las ileostomías de protección tras cirugía de cáncer de recto (IleoCaRe)	Cirugía
Fundación Española de Farmacia Hospitalaria	Resultados en vida real del uso de anticuerpos monoclonales para profilaxis de la migraña en Hospitales Españoles	Farmacia
Fundación Española de Farmacia Hospitalaria	Desarrollo de un registro centralizado nacional de extravasaciones de antineoplásicos	Farmacia
IMIDOMICS Inc	Sjögren Syndrome and Atopic Dermatitis cohorts' generation and multi-omics characterization (SSAD project) / Generación de cohortes y caracterización multiómica del Síndrome de Sjögren y la Dermatitis Atópica (Proyecto SSAD)	Dermatología
Sociedad Española de Cardiología	Diferencias de género en el manejo temprano y posterior al alta después de un infarto agudo de miocardio Genami prevention	Cardiología

Entidad financiadora	Titulo	Unidad HUFA
BeiGene, Ltd	Un estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego de BGB-A1217 y del anticuerpo anti-TIGIT, en combinación con tislelizumab comparado con pembrolizumab en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico inoperable o metastásico, no tratado previamente, con expresión de PD-L1 y localmente avanzado	Oncología
AbbVie Spain SLU	Estudio de fase 2 abierto en sujetos con cáncer de pulmón no microcítico no epidermoide localmente avanzado o metastásico con amplificación de MET no tratado previamente	Oncología
Fundación PETHEMA	Estudio multicéntrico, aleatorizado y abierto de romiplostim más dexametasona frente a dexametasona en pacientes con trombocitopenia inmune primaria recién diagnosticada	Hematología
Cerevel Therapeutics, LLC	Ensayo abierto de 58 semanas de tavapadón en la enfermedad de Parkinson (ensayo TEMPO-4)	Neurología
Arvinas Estrogen Receptor, Inc (Arvinas)	Estudio de Fase 2 abierto, aleatorizado y no comparativo de ARV-471 o anastrozol en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama ER+/HER2- en el entorno neoadyuvante	Oncología
PFIZER SLU	SCAIISS-II: Validation, cut-offs values and sensitivity to change for the classification of Bone Marrow Edema (BME) in sacroiliac joints MRI, in patients with Axial Spondylarthritis	Reumatología
Biogen Idec Research Limited	Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, de 2 partes sin interrupciones, parte A (fase II)/parte B (fase III), para evaluar la eficacia y la seguridad de BIIB059 en participantes con lupus eritematoso cutáneo subagudo activo o lupus eritematoso cutáneo crónico con o sin manifestaciones sistémicas y resistente o intolerante al tratamiento antipalúdico (AMETHYST)	Dermatología
NOVARTIS FARMACEUTICA SA	Estudio aleatorizado, doble ciego con doble enmascaramiento y grupos paralelos en el que se compara la eficacia y seguridad de remibrutinib frente a teriflunomida en participantes con esclerosis múltiple recurrente, seguido de una extensión abierta del tratamiento con remibrutinib	Neurología

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
Fundació de Gestió Sanitaria Sant Creu y Sant Pau	GEM21menos65. A Phase III trial for NDMM patients who are candidates for ASCT comparing Extended VRD plus Early Rescue Intervention vs Isatuximab-VRD vs Isatuximab-V-Iberdomide-D	Hematología
FIDIA FARMACEUTICI S.p.A	Estudio de fase III con un solo grupo para evaluar la eficacia y la seguridad de ONCOFID-P-B (conjugado paclitaxel-ácido hialurónico) administrado por vía intravesical a pacientes con carcinoma in situ de vejiga sin respuesta a BCG, con o sin enfermedad papilar Ta-T1	Urología
IKF KLINISCHE KREBSFORSCHUNG	Ensayo ABC-HCC: Ensayo en fase IIIb, aleatorizado, multicéntrico y abierto de atezolizumab más bevacizumab frente a quimioembolización transarterial (QETA) en carcinoma hepatocelular en estadio intermedio	Digestivo
HUFA	Bloqueo ecoguiado de nervios geniculares de rodilla en pacientes con gonartrosis mediante analgésico local o mediante la combinación de anestésico local con corticoide: Estudio piloto ciego aleatorizado controlado con placebo	Rehabilitación
Grupo Español de trasplantes hematopoyéticos y Terapia Celular (GETH)	Identificación de pacientes susceptibles de terapia CAR T usando tecnología de procesamiento del lenguaje natural (PLN)	Hematología
J. Enrique Domínguez Muñoz	Impacto del drenaje endoscópico pancreático sobre la función pancreática en pacientes con adenocarcinoma de páncreas no resecable: Estudio prospectivo, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego. Estudio DEPARA	Digestivo
Francisco Javier Pérez Gisbert (Hospital Universitario La Princesa)	Evidencia de vida real con upadacitinib en enfermedad inflamatoria intestinal. Estudio U-REAL	Digestivo
Department of Anesthesiology and Critical Care, Hospital Clinic de Barcelona	Complicaciones Pulmonares Postoperatorias en cirugía abdominal urgente. Incidencia y Factores de riesgo. Estudio prospectivo, observacional multicéntrico	Anestesia
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria	Validación de la herramienta de desprescripción LESS-CHRON en pacientes pluripatológicos	Farmacia

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria	Validación de la herramienta de desprescripción LESS-CHRON en pacientes pluripatológicos	Geriatría
Candela Corporation	Clinical Feasibility Study to Evaluate the Safety and Performance of the Profound Matrix System	Ginecología
ABBOT LABORATORIES SA	VALOR PRONÓSTICO DE LA MASA MUSCULAR REDUCIDA, DETERMINADA POR ECOGRAFÍA MÚSCULOESQUELÉTICA EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA	Medicina Interna
Fondazione Ricerca Traslazionale (FoRT)	Estudio de fase II, aleatorizado, no comparativo, en el que se investiga la mejor secuencia de inhibidores de la tirosina cinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR-TKI) en el cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) con mutaciones en el EGFR en estadio avanzado o metastásico	Oncología
Asociación Española para el estudio del Hígado	III Registro Español de Carcinoma Hepatocelular y otros tumores primarios hepáticos	Digestivo
ADVANCED MARKER DISCOVERY, S.L. (AMADIX)	Desarrollo de un algoritmo para detección temprana de cáncer de páncreas basado en factores de riesgo identificados mediante herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial.	Enfermedades Infecciosas
GALDERMA INTERNACIONAL	Encuesta DERMACNE	Dermatología
Universidad Europea de Madrid	La estimulación transcraneal por corriente directa combinada con el ejercicio aeróbico para el tratamiento del dolor lumbar crónico inespecífico: un ensayo clínico aleatorizado.	
Janssen Cilag SA	Estudio observacional para evaluar la adherencia a TREMFYA® (Guselkumab) en práctica clínica en pacientes con psoriasis moderada a severa	Farmacia
GSK Research & Development Limited	Estudio Fase III, multicéntrico, aleatorizado y doble ciego para evaluar la eficacia y seguridad de la administración de bepirovirsén en pacientes con Hepatitis B crónica HBeAg negativos y en tratamiento con análogos de nucleós(t)idos (B-Well 2)	Digestivo

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
BRISTOL-MYERS SA	Estudio observacional multicéntrico para describir la persistencia en pacientes con esclerosis múltiple recurrente-remitente con actividad baja a moderada, que han iniciado tratamiento con Ozanimod (Zeposia®) en la práctica clínica en España (Estudio AppreZiate).	Neurología
HMNC Holding GmbH	Estudio de fase II, multicéntrico, aleatorizado, con enmascaramiento doble, controlado con placebo y de 14 semanas de duración, con un periodo de tratamiento de 8 semanas, para evaluar la eficacia y la tolerabilidad de una dosis fija de BH-200 (250 mg dos veces al día) en pacientes ambulatorios con Trastorno Depresivo Mayor (TDM)	Psiquiatría
Asociación Española de Coloproctología (AACP)	Registro Nacional de neuromodulación sacra promovido por la Asociación Española de Coloproctología	Cirugía
	Utilidad del trabajo miocárdico del ventrículo izquierdo en la valoración de la mecánica ventricular en pacientes con estimulación en el área de rama izquierda	Cardiología
Merck Sharp & Dohme LLC	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de MK-0616 en adultos con hipercolesterolemia	Medicina Interna
Dra. Marina Varela Durán	Prevalencia y factores de riesgo de delirium postoperatorio a las 48 horas de la cirugía: estudio de cohorte multicéntrico	Anestesia
	Incidencia y etiología de las complicaciones asociadas a la anestesia regional de los nervios periféricos: estudio prospectivo	Anestesia
Fundación Española de Farmacia Hospitalaria	Gestión del impacto medioambiental de los inhaladores desde la Farmacia Hospitalaria (PROYECTO GIMAFH)	Farmacia
Fundación de Investigación Biomédica Hospital La Paz	Epigenetic biomarkers of biological age as predictors of AIDS, non-AIDS events, and diseases characteristics of aging in persons with HIV	Enfermedades Infecciosas
Emalex Biosciences, Inc	Estudio de retirada multicéntrica, doble ciego, controlado con placebo y aleatorizado para evaluar la seguridad y el mantenimiento de la eficacia del ecopipam en niños, adolescents y adultos con syndrome de Tourette	Psiquiatría

Entidad financiadora	Titulo	Unidad HUFA
Asociación Insuficiencia Cardíaca Sociedad Española Cardiología	Uso clínico y seguridad de Vericiguat (agonista oral de la guanilato ciclasa) en la práctica clínica real. Estudio observacional con medicamentos prospectivo	Cardiología
Sunovion Pharmaceuticals Inc	Estudio en fase II/III, aleatorizado, doble ciego, con grupos paralelos, comparativo con placebo, con dosis flexible y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de SEP-363856 en el tratamiento de adultos con trastorno de ansiedad generalizada	Psiquiatría
Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, de evaluación de la eficacia y seguridad del donepezilo versus placebo en e deterioro cognitivo leve asociado a la Enfermedad de Parkinson	Neurología
PHARMALINK	External Validation of Uromonitor as a biomarker for optimization of NMIBC management by the CUETO group. EVALUATION-CUETO Study	Urología
	Respuesta integral a dupilumab en pacientes con asma grave y rinosinusitis crónica con pólipos. Estudio INT2	Alergia
	Satisfacción con su tratamiento de pacientes con asma grave tratados con benralizumab en régimen de autoadministración domiciliaria	Alergia
Janssen Cilag SA	Estudio en fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de JNJ-77242113 para el tratamiento de pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave con retirada aleatorizada y retratamiento	Dermatología
Janssen Cilag SA	Estudio de fase IIb, multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo y de determinación de la dosis para evaluar la eficacia y la seguridad de JNJ-77242113 para el tratamiento de la colitis ulcerosa activa moderada a grave	Digestivo
ARENA PHARMACEUTICALS INC,	Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad del etrasimod por vía oral como tratamiento de inducción y mantenimiento para la enfermedad de Crohn activa de moderada a grave	Digestivo

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
	Estudio BOCADOS-IC: ensayo clínico aleatorizado prospectivo multicéntrico sobre el abordaje nutricional en Adultos seguidos en hospitales españoles por Insuficiencia Cardíaca	Cardiología
Laboratorios Salvat, S. A	Vincalm® Garganta survey Patient's perspective	
	Registro de tratamientos en la colangitis biliar primaria (CBP) Outcomes for Patients Living with Primary Biliary Cholangitis. A Retrospective International Registry Study	Digestivo
Merck Sharp & Dohme LLC	Estudio de fase 3, aleatorizado y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de MK-0616 para reducir las complicaciones cardiovasculares graves en participantes con riesgo cardiovascular elevado	Cardiología
Gilead Sciences SL	Proyecto Edison para el cribado dirigido de VIH	Enfermedades Infecciosas
VENTER PHARMA S.L	Non-interventional post-authorisation safety study to evaluate the tolerability of LacTEST 0.45 g for hypolactasia diagnosis in adolescents presenting symptoms of lactose intolerance	Pediatría
Blanca Coll-Vinent i Puig (H. Clinic de Barcelona)	Estudio del daño miocárdico en pacientes atendidos en urgencias por fibrilación auricular sintomática. Relevancia clínica, implicaciones pronósticas e isquemia coronaria subyacente	Urgencias
GlaxoSmithKline SA	RealZE: estudio retrospectivo de evidencia de mundo real de las características, los patrones de tratamiento y los desenlaces de pacientes recién diagnosticadas con cáncer de ovario seroso de alto grado epitelial avanzado	Oncología
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria	Evaluación del impacto asistencial de la salud móvil en el manejo integral del paciente oncológico que inicia tratamiento antineoplásico	Farmacia
Fundación Española de Farmacia Hospitalaria	Evaluación del impacto asistencial de la salud móvil en el manejo integral del paciente con Esclerosis Múltiple	Farmacia

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
KYOWA KIRIN FARMACEÚTICA, S.L.U.	Identificación de pacientes con un potencial diagnóstico de hipofosfatemia mediada por FGF23 utilizando procesamiento de lenguaje natural en España: Estudio no intervencionista, transversal, multicéntrico, en mundo real, estudio piloto	Pediatría
GlaxoSmithKline SA	A real-world retrospective observational study of patients with advanced or recurrent Endometrial Cancer in Spain	Oncología
	Eficacia y seguridad de una cuádruple terapia con bismuto en niños con infección por Helicobacter pylori y doble resistencia (claritromicina y metronidazol)	Pediatría
Comité Alergia a Alimentos Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica	Creación de una base de datos para el control y seguimiento de los pacientes con Síndrome LTP: Alergia alimentaria por sensibilización a las proteínas transportadoras de lípidos, LTPs. Alimentos implicados, métodos diagnósticos, estrategias terapéuticas, evolución de los pacientes	Alergia
	Rationale and study design for an Individualized Perioperative Open lung Ventilatory approach in Emergency Abdominal Laparotomy/scopy: study protocol for a prospective international randomized controlled trial.	Anestesia
Janssen Cilag SA	Estudio en fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y controlado con el comparador activo deucravacitinib para evaluar la eficacia y la seguridad de JNJ 77242113 para el tratamiento de pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave.	Dermatología
FIIS-FJD	Tratamiento de tralokinumab en paciente de dermatitis atópica en práctica clínica real	Dermatología
NOVO NORDISK A/S	Eficacia y seguridad de cagrilintida y semaglutida (CagriSema 2,4 mg/2,4 mg) administradas de forma conjunta una vez a la semana frente a semaglutida 2,4 mg, cagrilintida 2,4 mg y placebo en personas con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2 que tienen sobrepeso u obesidad	Endocrinología

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
Grupo de delirium de la Sociedad Española de Geriátría y Gerontología	Estudio multicéntrico de la prevalencia del delirium en personas mayores de 65 años con fractura de fémur proximal ingresados en una Unidad de Orto geriatria	Geriatría
Grupo Centro de Diálisis Peritoneal (GCDP), en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)	Estudio PUMA Estudio Piloto de Uso de MiDiálisis App	Nefrología
ORYZON GENOMICS S.A.	Estudio de fase IIb, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, adaptativo, de 24 semanas de duración, para evaluar la eficacia de vafidemstat en síntomas negativos y deterioro cognitivo asociado a la esquizofrenia. (Estudio EVOLUTION).	Psiquiatría
GELTAMO	Supervivencia de los pacientes con linfoma de células del manto (LCM) en la vida real en España y análisis de los factores con impacto de la evolución (MCL-RW22)	Hematología
GELTAMO	Experiencia en vida real sobre el manejo de pacientes con linfoma B difuso de célula grande con estadio localizado	Hematología
Emalex Biosciences, Inc	Estudio abierto y multicéntrica para evaluar la seguridad a largo plazo de los comprimidos de ecopipam en niños, adolescentes y adultos con síndrome de Tourette	Psiquiatría
Merck Sharp & Dohme LLC	Estudio de extensión de fase 3 abierto para evaluar la seguridad y la eficacia de MK-0616 en adultos con hipercolesterolemia	Medicina Interna
LILLY SA	Estudio de fase 3, aleatorizado, con enmascaramiento doble, comparativo con un placebo, para investigar el efecto de lepodisirán sobre la reducción de los acontecimientos cardiovasculares adversos graves en adultos que presenten elevación de la lipoproteína(a) y enfermedad cardiovascular aterosclerótica confirmada o riesgo de sufrir un primer acontecimiento cardiovascular - ACCLAIM-Lp(a)	Medicina Interna

Entidad financiadora	Titulo	Unidad HUFA
Noema Pharma SA	Estudio de fase II/III multicéntrico, prospectivo, doble ciego y controlado con placebo de doce semanas de duración para evaluar la eficacia y la seguridad de gemlapodect en pacientes adultos y adolescentes con síndrome de Tourette	Psiquiatría
Incyte Corporation	Estudio en fase III, aleatorizado, con enmascaramiento doble, de 52 semanas y comparativo con placebo sobre la eficacia y la seguridad de povorcitinib en participantes con vitiligo no segmentario.	Dermatología
Fundación Española de Farmacia Hospitalaria	Registro Nacional y Análisis de intervenciones farmacéuticas en unidades de cuidados clínicos	Farmacia
GlaxoSmithKline Biologicals S.A	Estudio Fase IIIb, aleatorizado, abierto, multinacional, multicéntrico, de extensión y vacunación cruzada para evaluar la inmunogenicidad y seguridad de diferentes pautas de revacunación, así como la persistencia de una dosis única de la vacuna RSVPreF3 OA en adultos de 60 años o más de edad que participaron en el estudio RSV OA=ADJ-006	Salud laboral
Inmunotek,S.L	Seguimiento clínico prospectivo para evaluar la seguridad de la inmunoterapia para el tratamiento de la alergia al veneno himenópteros en condiciones de vida real	Alergia
European Society of Cardiology/Global Registries and Surveys Programme	Encuesta Europea sobre prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedad renal crónica.	Cardiología

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
Grupo de trabajo- Terapia presión negativa	Prevención de complicaciones del sitio quirúrgico, aplicando terapia de presión negativa incisional de un solo uso PICO™. Estudio prospectivo multicéntrico de hospitales de España y Portugal IBERPICO	Cirugía
Daiichi Sankyo Europe GmbH	Estudio no intervencionista sobre el tratamiento con ácido bempedoico y/o su combinación de dosis fija con ezetimiba en la práctica clínica habitual en pacientes con hipercolesterolemia primaria o dislipidemia mixta	Medicina Interna
HOH Health SL	Estudio observacional retrospectivo para describir la variabilidad de resultados entre centros en pacientes con pie diabético en España	Cirugía Vasculat
AMGEN SA	Estudio aleatorizado y con doble enmascaramiento para comparar la farmacocinética entre ABP 234 y Keytruda® (pembrolizumab) en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico y no epidermoide en fase inicial como tratamiento posquirúrgico tras la resección y la quimioterapia con derivados del platino.	Oncología
MoonLake Immunotherapeutics AG	Estudio en fase III, aleatorizado, con enmascaramiento doble, controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de sonelokimab subcutáneo en participantes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a grave	Dermatología
Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología	CLINI-AEDVr. Plataforma de recogida de series de casos retrospectivos de la AEDV	Dermatología
Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología	CLINI-AEDVp. Plataforma de recogida de series de casos prospectivos de la AEDV	Dermatología
	Propuesta de creación de percentiles de pérdida de peso en pacientes intervenidos de cirugía bariática	Cirugía

Entidad financiadora	Titulo	Unidad HUFA
Janssen Cilag SA	Estudio no intervencionista retrospectivo para desarrollar un modelo de IA basado en imágenes para la predicción de la recurrencia metastásica en pacientes con cáncer de próstata localizado. Estudio PROVIDENCE	Urología
Amsterdam University Medical Centers location AMC	Práctica de la Terapia con Fluidos en Pacientes Críticamente Enfermos con Ventilación Invasiva (PRoFLUID) — un estudio de cohorte observacional internacional multicéntrico Los investigadores de PRoFLUID Practice of Fluid Therapy in Critically Ill Invasively Ventilated Patients (PRoFLUID)—an international multicenter observational cohort study The PRoFLUID—investigators	Cuidados Críticos
Vertanical GmbH	Ensayo multicéntrico, doble-ciego, aleatorizado, controlado con placebo, de dosis-respuesta con el extracto de espectro completo de Cannabis VER-01 en pacientes con lumbalgia inespecífica crónica	Neurología
PPM Services S.A	Ensayo de fase III para evaluar la eficacia y seguridad de N-acetil-GED-0507-34-LEVO gel al 5%, aplicado una vez al día durante 12 semanas en pacientes con acné vulgar (GEDACNE-2).	Dermatología
PPM Services S.A	Ensayo de seguridad y eficacia a largo plazo de N-Acetil-GED-0507-34-LEVO gel al 5%, en sujetos con acné vulgar (GEDACNE-LT)	Dermatología
AMGEN SA	Estudio aleatorizado, con doble enmascaramiento para comparar la eficacia, la farmacocinética, la seguridad y la inmunogenia entre ABP 234 y Keytruda® (pembrolizumab) en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico no epidermoide avanzado o metastásico	Oncología

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
Dra. Clara Bonanad Lozano	Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, abierto, de grupos paralelos, para definir la mejor estrategia para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica en pacientes ancianos con o con alto riesgo de hiperpotasemia en España optimizando el uso de iSRAA con CSZ: Estudio SENEKA	Cardiología
Sociedad Española de Cardiología	Women`s Health: an imAging-based cardiovascular risK-rEdUction Program WAKE UP	Cardiología
Astrazeneca AB	Estudio de fase II, abierto, para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética, inmunogenicidad y actividad antitumoral de pautas iniciales de volrustomig en combinación con otros fármacos antineoplásicos en participantes con tumores sólidos (eVOLVE-01).	Oncología
	Enfermedad por mycobacterium bovis en la Comunidad de Madrid: Estudio retrospectivo multicéntrico	Microbiología
Roche Farma SA	Estudio transversal y no intervencional para evaluar la perspectiva de los pacientes sobre la atención de la esclerosis múltiple remitente-recurrente en etapa temprana (estudio DECIDING-MS)	Neurología
AMGEN SA	Estudio aleatorizado, con doble enmascaramiento y con grupos paralelos para comparar la farmacocinética, la farmacodinamia, los efectos clínicos y la seguridad entre ABP 692 y Ocrevus® (ocrelizumab) en pacientes con esclerosis múltiple remitente recidivante.	Neurología
Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología	Estudio de resultados funcionales y calidad óptica con la lente intraocular de óptica en espiral Ray-one Galaxy (Rayner) en la cirugía de la presbicia.	Oftalmología

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
LYSARC	Estudio de fase III, aleatorizado, abierto, internacional y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad del mosunetuzumab combinado con lenalidomida en comparación con un anticuerpo monoclonal anti-CD20 combinado con quimioterapia en pacientes con linfoma folicular FLIPI 2-5 sin tratamiento previo	Hematología
SEPAR	Estudio ASSET. Active search for severe emphysema with pulmonary hyperinsuflacion pulmonar as a treatable feature	Neumología
AbbVie Deutschland GmbH & Co KG	Estudio de fase II, abierto, para evaluar la seguridad y la eficacia de telisotuzumab vedotin (ABBV-399) en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico c-Met+ tratado previamente	Oncología
AbbVie Deutschland GmbH & Co KG	Estudio de fase 1, de primera administración en el ser humano, para evaluar la seguridad, la farmacocinética y la eficacia de ABBV-400 en sujetos adultos con tumores sólidos avanzados	Oncología
Astrazeneca AB	'BRISOTE: Estudio de fase IIIb, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos y controlado con tratamiento activo para evaluar la eficacia y la seguridad de benralizumab 30 mg s.c. en pacientes con asma eosinofílico no controlado con corticosteroides inhalados a dosis medias más agonistas β 2 de acción prolongada''	Alergia
Fundación GECP	Ensayo clínico Fase III de quimioterapia versus quimioinmunoterapia como tratamiento adyuvante en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico estadio IB-IIIa con resección completa	Oncología
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias	Estudio descriptivo retrospectivo sobre hiperpotasemia en Urgencias (Estudio Hik-ED)	Urgencias
Sociedad Española de Neurología	Registro Español de Esclerosis Múltiple. Propuesta a la Sociedad Española de Neurología.	Neurología
Celldex Therapeutics, Inc	Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad del barzolvolimab en pacientes con urticaria espontánea crónica que siguen presentando síntomas a pesar de recibir tratamiento con antihistamínicos H1 (EMBARQ - CSU2	Dermatología

Entidad financiadora	Título	Unidad HUFA
Probelte Pharma S.L.U.	Evaluación de la seguridad y efectividad de Beltaven en pacientes con alergia a Apis mellifera, Polistes dominula o Vespula spp	Alergia
IPSEN PHARMA SA	Vivir con CBP. Mapa de experiencia del paciente con CBP	
Roche Farma SA	Estudio de fase III, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento de inducción con RO7790121 en pacientes con enfermedad de Crohn activa de moderada a grave	Digestivo
GBG Forschungs GmbH	Estudio fase III de post-neoadyuvancia que evalúa Sacituzumab Govitecan, un anticuerpo conjugado, en pacientes con cáncer primario de mama HER2 negativo con alto riesgo de recaída tras el tratamiento neoadyuvante estándar – SASCIA	Oncología
GEICAM	Estudio Fase II, aleatorizado, para evaluar la incidencia de discontinuación debida a Diarrea en los 3 primeros ciclos de tratamiento en pacientes con Cáncer de Mama Precoz HER2 positivo (HER2+), Receptor Hormonal positivo (RH+), tratados con Neratinib más Loperamida versus Neratinib con escalada inicial de dosis más Loperamida (según necesidad) versus Neratinib más Loperamida más Colesevelam. Estudio DIANER	Oncología
FI H Gregorio Marañón	EFICACIA DE LA COLCHICINA EN PREVENCIÓN SECUNDARIA DE EVENTOS VASCULARES Y PROGRESIÓN RENAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA MODERADA (ESTUDIO COLCHIREN)	Nefrología
GSK Research & Development Limited	Estudio de fase II, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, comparativo con placebo, de determinación de la dosis y con grupos paralelos para evaluar un anticuerpo anti-TSLP (GSK5784283) en adultos de 18 a 75 años con asma no controlada	Alergia
Grigory Vasiliev	Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con activo, de grupos paralelos para evaluar la seguridad y eficacia del apósito antibacteriano Nanordica en pacientes con úlceras del pie diabético	Cirugía Vasculat

Entidad financiadora	Titulo	Unidad HUFA
SOLTI	Estudio de fase III, multicéntrico y abierto de ribociclib en comparación con palbociclib en pacientes con cáncer de mama avanzado con receptores hormonales positivos/HER2-negativo/HER2-Enriquecido - ensayo HARMONIA	Oncología
LOGEX B.V	Estudio observacional retrospectivo del mundo real para describir el uso de recursos sanitarios y los costes asociados a las vías de tratamiento de la psoriasis en fuentes de datos hospitalarios	Dermatología
AbbVie Deutschland GmbH & Co KG	Estudio en fase IIIb, abierto, multicéntrico y aleatorizado de risankizumab en comparación con vedolizumab para el tratamiento de pacientes adultos con colitis ulcerosa de moderada a grave que anteriormente no han recibido tratamientos dirigidos	Digestivo
Dr. Fernando Ramasco Rueda (H.U. La Princesa)	Estudio prospectivo observacional multicéntrico de pacientes en tratamiento con vasopresina en Unidad de Cuidados Críticos	Anestesia