

NUCALA 100 MG PLUMA PRECARGADA MEPOLIZUMAB



¿Qué es y para qué se utiliza?

Nucala contiene mepolizumab, un fármaco que se une a la IL-5 evitando la diferenciación y activación de eosinófilos, un tipo de células inmunitarias implicadas en el asma eosinofílica, reduciendo así su producción y supervivencia.


Por tanto, se utiliza en asma eosinofílica refractaria grave en adultos, adolescentes y niños >6 años.

Medicamento	Pauta	Cómo administrarlo
Nucala (mepolizumab)	100 mg (1 pluma) cada 4 semanas	Se administra por vía SUBCUTANEA. Saque la pluma de la nevera media hora antes de la administración Se recomienda variar el lugar en cada administración para evitar que la piel se irrite.

Modo de administración



1. Lávese las manos cuidadosamente
2. Sujete la pluma en posición vertical y retire la tapa. No toque la aguja. Pueden caer algunas gotas de líquido, es normal.
3. Desinfecte la zona de inyección utilizando un algodón con alcohol
4. Mantenga la piel estirada o pellizcada. Una vez retirado el capuchón, sitúe la pluma sobre la piel con un ángulo de 90 **grados**.
5. Presione la pluma a 90 grados sobre la piel, y mantenga durante unos 15 segundos



6. Verá como el embolo de la pluma comienza a bajar
7. Retire la pluma con cuidado y deséchela en el contenedor.



¿Y si se me olvida alguna administración?

Adminístreselo lo antes posible. En la próxima revisión coménteselo a su médico o farmacéutico.

No doble nunca la dosis.

¿Cómo conservarlo?

Mantenga las plumas en su envase original, **dentro de la nevera** (entre 2 y 8°C). **NO CONGELAR**

Una vez utilizado el medicamento, deposite el dispositivo en el contenedor que le hemos facilitado. Cuando se llene 2/3 de su capacidad, ciérrelo y entréguelo en Farmacia para su correcta destrucción. **Nucala® puede usarse hasta 7 días una vez se ha sacado de la nevera.**



POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Avisé a su médico si nota cualquiera de estos síntomas o algún otro no mencionado aquí:

- ❖ Reacción en el lugar de inyección (enrojecimiento, picor, dolor, hinchazón) pero suele desaparecer después del primer mes.
- ❖ Dolor de cabeza, dolor de espalda
- ❖ Congestión nasal, faringitis, infección respiratoria

CONTRAINDICACIONES



- ❖ Alergia a alguno de los componentes.



ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:



Tomar otros medicamentos y NUCALA

El potencial de interacciones farmacológicas con mepolizumab se considera bajo. Informe a su médico o farmacéutico si ha utilizado o está utilizando otros medicamentos para revisarlos.



Embarazo y lactancia

- ❖ No se recomienda durante la lactancia, ni en el embarazo.
- ❖ Utilice **métodos anticonceptivos** eficaces durante el tratamiento.
- ❖ Si pretende quedarse embarazada informe a su médico o farmacéutico



Otras advertencias de interés: Avise a su médico si presenta:

- Fiebre, tos persistente, malestar, pérdida de peso, dolor al orinar.
- Hormigueo, entumecimiento, visión doble, debilidad en brazos y piernas.
- Dificultad para respirar o hinchazón de los pies.
- Si tiene infecciones parasitarias
- Si es alérgico al látex



Conducción

La influencia de Nucala sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.



¿Puedo tomar bebidas alcohólicas?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interaccionar con algunos de los medicamentos que está tomando

RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.

Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfono de contacto: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2458/2620/2025

Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

Para CAMBIOS DE CITA o
RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este
código QR



Para consultar otra información de
nuestra Página Web escanee este
Código QR

