



XOLAIR JERINGA PRECARGADA (75 O 150 MG) OMALIZUMAB

¿Qué es y para qué se utiliza?


Xolair contiene omalizumab, un fármaco que se une a la Inmunoglobulina de tipo E (IgE) en basófilos y mastocitos, dos tipos de células inmunitarias, reduciendo así la cantidad de IgE desencadenante de la alergia.

Por tanto, se utiliza en asma alérgica grave en adultos, adolescentes y niños >6 años (cuando sea mediada de forma convincente por IgE) y en urticaria crónica espontánea (UCE) a partir de 12 años en pacientes con respuesta inadecuada al tratamiento con antihistamínicos de tipo H1.

Medicamento	Pauta	Cómo administrarlo
Xolair (omalizumab)	Asma alérgica: pauta variable, dependiente del peso y nivel de IgE basal Urticaria crónica espontánea: dosis recomendada de 300 mg cada 4 semanas	Se administra por vía SUBCUTANEA. Saque la jeringa de la nevera media hora antes de la administración Se recomienda variar el lugar en cada administración para evitar que la piel se irrite. La dosis de más de 150 mg se deben administrar divididas en dos o más lugares de inyección.

Modo de administración

1. Lávese las manos cuidadosamente
2. Sujete firmemente la jeringa y retire la cubierta de plástico que cubre la aguja
3. Desinfecte la zona de inyección utilizando un algodón con alcohol, y pellizque la piel con los dedos pulgar e índice, sin apretar
4. Introduzca la aguja en toda su longitud formando un ángulo de 45º con la piel
5. Inyecte toda la solución de forma lenta y constante
6. Al terminar, retire la aguja sin soltar el émbolo, la aguja se esconderá para evitar pinchazos. Desinfecte la piel con alcohol
7. Retire las jeringas en un contenedor adecuado



¿Y si se me olvida alguna administración?

Adminístreselo lo antes posible. En la próxima revisión coménteselo a su médico o farmacéutico.
No doble nunca la dosis.



¿Cómo conservarlo?

Mantenga las jeringas en su envase original, **dentro de la nevera** (entre 2 y 8ºC). **NO CONGELAR**
Una vez utilizado el medicamento, deposite el dispositivo en el contenedor que le hemos facilitado. Cuando se llene 2/3 de su capacidad, ciérrelo y entréguelo en Farmacia para su correcta destrucción.




POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Avisé a su médico si nota cualquiera de estos síntomas o algún otro no mencionado aquí:

- ❖ Reacción en el lugar de inyección (enrojecimiento, picor, dolor, hinchazón) pero suele desaparecer después del primer mes.
- ❖ Dolor de cabeza, dolor abdominal, faringitis, pirexia.

CONTRAINDICACIONES

 ❖ Alergia a alguno de los componentes.



ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:



Tomar otros medicamentos y XOLAIR

El potencial de interacciones farmacológicas con omalizumab se considera bajo. Informe a su médico o farmacéutico si ha utilizado o está utilizando otros medicamentos para revisarlos.



Embarazo y lactancia

- ❖ No se recomienda durante la lactancia, ni en el embarazo.
- ❖ Utilice **métodos anticonceptivos** eficaces durante el tratamiento.
- ❖ Si pretende quedarse embarazada informe a su médico o farmacéutico



Otras advertencias de interés: Avise a su médico si presenta:

- Fiebre, tos persistente, malestar, pérdida de peso, dolor al orinar.
- Hormigueo, entumecimiento, visión doble, debilidad en brazos y piernas.
- Dificultad para respirar o hinchazón de los pies.
- Si tiene infecciones parasitarias
- Si es alérgico al látex



Conducción

La influencia de Xolair sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.



¿Puedo tomar bebidas alcohólicas?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interactuar con algunos de los medicamentos que está tomando

RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.

Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2458/2620/2025

Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR

