



Doptelet 20 mg, comprimidos recubiertos con película (Avatrombopag)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Doptelet® es un medicamento indicado para tratar situaciones de disminución de las plaquetas circulantes en sangre por debajo de los niveles normales.

Se utiliza con el fin de producir un aumento del número de plaquetas en sangre para reducir el riesgo de hemorragias en pacientes que tienen programada una intervención invasiva.

¿Cómo se toma?

Medicamento	Pauta	Cómo tomarlo
Doptelet (Avatrombopag)	2 ó 3 comprimido al día (En función del recuento de plaquetas) Durante 5 días	CON alimentos No masticar, machacar ni dividir el comprimido El tratamiento se debe iniciar entre 10 y 13 días antes de la intervención. Deberá someterse a la intervención entre 5 y 8 días tras la última dosis de avatrombopag

Es muy importante que **no deje de tomar su tratamiento** y recuerde **tomarlo siempre a la misma hora del día.**



¿Y si se me olvida alguna toma?

- ❖ Tome la **dosis olvidada lo antes posible** y después tome la **próxima dosis** a la hora habitual.
- ❖ **Nunca duplique la dosis para compensar un olvido.**



¿Cómo conservarlo?

Este medicamento no necesita condiciones de conservación especiales.

CONTRAINDICACIONES



- ❖ Alergia a alguno de los componentes.
- ❖ intolerancia hereditaria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa
- ❖ Embarazo
- ❖ Considerar beneficio/riesgo durante lactancia

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Alguno de los siguientes efectos adversos puede aparecer durante el tratamiento con avatrombopag:

- ❖ Cansancio, debilidad.
- ❖ Anemia
- ❖ Dolor óseo o muscular
- ❖ Fiebre



ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:



Tomar otros medicamentos y Doptelet

Doptelet puede interactuar con otros medicamentos, haciendo que no funcionen correctamente o que empeoren sus posibles efectos adversos, como:

- ❖ **ketoconazol, fluconazol, itraconazol, ritonavir, voriconazol** : aumentan la exposición a Doptelet
- ❖ **rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína y hierba de San Juan**: reducen la exposición a Doptelet



Embarazo y lactancia

- ❖ Si planea quedarse embarazada mientras toma Doptelet, consulte antes con su médico.
- ❖ Se recomienda no dar lactancia materna para evitar posibles transferencias del fármaco a través de la leche materna
- ❖ No se recomienda el uso de Doptelet durante embarazos ni en mujeres fértiles que no utilicen métodos anticonceptivos



Conducción

La influencia de Doptelet sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.



RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.

Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91-6839360

- Cambio de cita: 2623/6348

- Resolución de dudas: 2843/2023

Horario:

- Lunes a viernes de 10 a 14:30 h

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR

