


COBIMETINIB (Cotellic®)



¿Qué es COBIMETINIB y para qué se utiliza?

Es un antineoplásico, pertenece a un grupo de fármacos conocidos como inhibidores de la tirosin kinasa (ITK). Impide el crecimiento de células tumorales, utilizado junto con VEMURAFENIB en el tratamiento del melanoma (cáncer de piel).

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a COBIMETINIB o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal, hepática, cardíaca, visuales, musculares.
- Sangrados o toma medicación que pueda ocasionarlos.

Excipientes: Lactosa



¿Cómo debe tomar Cobimetinib?

Medicamento	Pauta	Cómo administrarlo
COBIMETINIB (Cotellic)	3 comprimidos (60mg) una vez al día DURANTE 3 SEMANAS + 1 SEMANA DE DESCANSO	<ul style="list-style-type: none"> • Se toma una vez al día, siempre a la misma hora. • Los comprimidos se deben ingerir con agua con o sin alimentos • Tómelo con un vaso de agua. No fraccione ni mastique los comprimidos.
VEMURAFENIB (Zelboraf)	4 comprimidos (960mg) dos veces al día TODOS LOS DÍAS, SIN DESCANSO	<ul style="list-style-type: none"> • Se toma dos veces al día, siempre a la misma hora, cada 12 horas. • Los comprimidos se deben ingerir con agua con o sin alimentos (preferible con alimentos) • Tómelo con un vaso de agua. No fraccione ni mastique los comprimidos.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si quedan MÁS de 12 horas para la próxima dosis: Tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.

Si quedan MENOS de 12 horas para la próxima dosis: NO tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.

En caso de vómito, **NO** tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.



¿Cómo conservar COBIMETINIB?

A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.





¿Qué efectos adversos puede tener?

La reacción que cada persona tiene a su tratamiento es única. Hay personas que tienen pocos efectos adversos, mientras que hay otras que tienen más. A continuación, se exponen los más comunes, a fin de que sea consciente de ellos y sepa detectarlos si ocurre alguno. Si nota alguna reacción que crea que puede deberse a la medicación, pero que no está incluida en este folleto, deberá hacérselo saber a su médico y/o farmacéutico.

Alteraciones gastrointestinales → diarrea, náuseas, vómitos

Reacción dérmica

Hipertensión → Control de la tensión arterial

Cansancio, fatiga, debilidad

Avise a su médico y/o farmacéutico si presenta:

- Sangrado inusual o cualquiera de estos síntomas: dolores de cabeza, mareos, sensación de debilidad, sangre en las heces o heces negras y vómitos con sangre.
- Dolores musculares, espasmos musculares, debilidad u orina oscura o rojiza.
- Visión borrosa, distorsionada, parcialmente deficitaria o cualquier otro cambio en la vista.



¿COBIMETINIB puede interactuar con otros fármacos?

Algunos medicamentos pueden interactuar con COBIMETINIB. Informe a su médico y farmacéutico de cualquier medicación que vaya a empezar a tomar o esté tomando, incluyendo medicamentos que se adquieren sin receta, tales como suplementos o plantas medicinales y derivados.

ADVERTENCIAS



Embarazo y lactancia

- ❖ CONTRAINDICADO en mujeres embarazadas o que puedan estarlo y en la lactancia.
- ❖ Se recomienda utilizar medidas contraceptivas eficaces tanto en hombres como en mujeres durante y después de finalizar el tratamiento (al menos 3 meses), ya que puede provocar daños en el desarrollo fetal.



Conducción

- ❖ Si experimentan trastornos visuales o algún otro efecto adverso que pueda afectar a su capacidad para conducir.



Otras advertencias de interés:

- ❖ En caso de finalizar el tratamiento, devuelva al Servicio de Farmacia la medicación sobrante, no los deseche en la basura de su domicilio.
- ❖ No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Consulta de Atención Farmacéutica Oncológica-Hematológica

Horario: 08:00 a 22:00 h

Teléfono: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2843/2023

Horario de la consulta:

- Lunes a viernes de 10:00 a 14:30 h

Para CAMBIOS DE CITA o
RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este
código QR



Para consultar otra información de
nuestra Página Web escanee este
Código QR

