



FAMPYRA COMPRIMIDOS 10 MG FAMPRIDINA

¿Qué es y para qué se utiliza?

Fampyra se utiliza para mejorar la marcha en pacientes adultos diagnosticados de Esclerosis Múltiple.

Es una enfermedad que a largo plazo afecta al sistema nervioso central (cerebro y la médula espinal).

Se caracteriza por presentar ataques repetidos (brotes) de síntomas de afectación neurológica.

Estos síntomas pueden desaparecer por completo cuando el brote llega a su fin, pero algunos problemas pueden permanecer.

La fampridina es un fármaco bloqueador de los canales de potasio de las células nerviosas.

¿Cómo se toma?

Medicamento	Pauta	Cómo tomarlo
Fampyra (fampridina)	1 comprimido/ 12 h	SIN alimentos (al menos 1 hora antes o 2 horas después de las comidas) No tome mas de dos comprimidos al día. No se debe triturar, dividir, ni masticar

Es muy importante que **no deje de tomar su tratamiento** y recuerde tomarlo siempre en el mismo momento del día.



¿Y si se me olvida alguna toma?

❖ Nunca duplique la dosis para compensar un olvido.



¿Cómo conservarlo?

Conserve a temperatura ambiente **por debajo de 25º**, protegido de luz y humedad y en envase original.

CONTRAINDICACIONES



- ❖ Alergia al principio activo o a alguno de los excipientes.
- ❖ Tratamiento concurrente con otros medicamentos que contengan fampridina (4-aminopiridina)
- ❖ Pacientes con historia previa o presentación actual de crisis epilépticas
- ❖ Pacientes con insuficiencia renal moderada o grave (aclaramiento de creatinina menor a 50 ml/min)
- ❖ Uso concomitante con cimetidina u otros fármacos inhibidores del transportador de cationes orgánicos 2 (OCT2)

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Es posible que presente alguno o ningún de los siguientes síntomas.

Avisé a su médico si nota alguno de estos síntomas o cualquier otro:

- ❖ Mayor susceptibilidad a infecciones: infección urinaria, gripe, nasofaringitis, infecciones víricas
- ❖ Trastornos en sistema nervioso: insomnio, ansiedad, mareos, cefaleas, trastorno del equilibrio, vértigos, parestesias, temblores.
- ❖ Trastornos digestivos: náuseas, vómitos, estreñimiento, dispepsia
- ❖ Trastornos cardiacos: palpitaciones
- ❖ Dolor de espalda



ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:



Tomar otros medicamentos y Fampyra

Fampridina puede interactuar con otros medicamentos, haciendo que no funcionen correctamente o que empeoren sus posibles efectos adversos:

- ❖ **Cimetidina** (Inhibidores del OCT2)
- ❖ **Carvedilol, propranolol, metformina** (sustratos del OCT2)
- ❖ Otros medicamentos que contengan **fampridina (4-aminopiridina)**



Embarazo y lactancia

- ❖ Los datos son limitados. Es preferible evitar el uso de fampridina durante el embarazo
- ❖ Se desconoce si la fampridina se excreta en la leche. No se recomienda usar Fampyra durante la lactancia



Otras advertencias de interés. Avise a su médico si presenta síntomas de infección:

-Entre las **4 y 8 primeras semanas de tratamiento** puede producir **caídas y mareos** por lo que hay que si es usted dependiente de apoyos para andar como bastón o andador, debe tener especial precaución



Conducción

La influencia de Fampyra sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es moderada, ya que **puede producir mareos**.



¿Puedo tomar bebidas alcohólicas con Fampyra?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interactuar con algunos de los medicamentos que está tomando

RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.

Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Consultas: 2458/2620/2025

Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR

