

RILUZOL 50MG COMP



¿Qué es y para qué se utiliza?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es un tipo de enfermedad neuronal motora que afecta a las células nerviosas responsables del envío de señales a los músculos y que produce debilidad, pérdida de masa muscular y parálisis.

Riluzol actúa sobre el sistema nervioso y puede ayudar a prevenir el daño en las células nerviosas.

¿Cómo se toma?

Medicamento	Pauta	Cómo tomarlo
Riluzol 50mg comp	1 cada 12h	CON o SIN alimentos

Es muy importante que **no deje de tomar su tratamiento y recuerde tomarlo siempre en el mismo momento del día.**



¿Y si se me olvida alguna toma?

- ❖ Si olvida tomar el comprimido, omita esta dosis y tome el próximo comprimido a la hora habitual.
- ❖ **Nunca duplique la dosis para compensar un olvido.**



¿Cómo conservarlo?

Conserve este medicamento a **temperatura ambiente**, lejos de las fuentes de calor y frío.

CONTRAINDICACIONES



- ❖ Alergia a alguno de los componentes.
- ❖ Alteración de la función hepática
- ❖ Embarazo o lactancia.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Algunos pacientes pueden experimentar alguno de estos síntomas:

- ❖ Debilidad
- ❖ Náuseas
- ❖ Alteración de pruebas de función hepática (elevación de transaminasas)
- ❖ Dolor de cabeza, mareo.
- ❖ Diarrea, dolor abdominal, vómitos
- ❖ Adormecimiento u hormigueo de la boca
- ❖ Disminución de las células de las defensas (muy raro). Avise a su médico en caso de fiebre



ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:



Tomar otros medicamentos y Riluzol

Riluzol puede interactuar con otras sustancias, haciendo que no funcionen o empeoren sus posibles efectos adversos, como:



- ❖ **Cafeína**
- ❖ **Diclofenaco**
- ❖ **Diazepam**
- ❖ **Clomipramina, imipramina, amitriptilina, fluvoxamina**
- ❖ **Ciprofloxacino**
- ❖ **Rifampicina**
- ❖ **Omeprazol**
- ❖ **Fumar cigarrillos.**



Embarazo y lactancia

- ❖ Riluzol está contraindicado en el embarazo.
- ❖ Riluzol está contraindicado en mujeres que están amamantando



Conducción

Si sufre mareos o vértigos se aconseja no conducir ni manejar maquinaria.



¿Puedo tomar bebidas alcohólicas con riluzol?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado).

RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.

Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91-6839360

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2458/2620/2025

Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR

