



ESBRIET COMP. RECUBIERTOS 267 Y 801 MG PIRFENIDONA

¿Qué es y para qué se utiliza?

Este medicamento tiene como principio activo la pirfenidona y está indicado en el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI).

La FPI es una enfermedad que provoca engrosamiento, rigidez y cicatrización del tejido de sus pulmones a lo largo del tiempo.

¿Cómo se toma?

Medicamento	Pauta	Cómo tomarlo
Esbriet Pirfenidona	<ul style="list-style-type: none"> - Días 1 a 7: 1 comprimido 267 mg / 8 h - Días 8 a 14: 2 comprimidos 267 mg / 8 h - Día 15 y en adelante: 1 comprimido 801 mg / 8h 	<p>CON alimentos para reducir la posibilidad de náuseas y mareos</p> <p>Debe tragarse entero, sin partir con un vaso de agua.</p>

Es muy importante que **no deje de tomar su tratamiento y recuerde tomarlo siempre en el mismo momento del día.**

Los pacientes que dejen de tomar el tratamiento con Esbriet durante 14 días consecutivos o más tiempo deben reiniciar el tratamiento con un aumento gradual de la dosis durante las 2 primeras semanas hasta alcanzar la dosis diaria recomendada.



¿Y si se me olvida alguna toma?

- ❖ **Nunca duplique ni aumente la dosis para compensar un olvido.**
- ❖ Si han pasado menos de tres horas, tome la dosis olvidada y continúe con la pauta habitual en el horario habitual.



¿Cómo conservarlo?

Conserve este medicamento a una temperatura **inferior a 25°C**

CONTRAINDICACIONES



- ❖ Alergia a alguno de los componentes.
- ❖ Antecedentes de angioedema con Pirfenidona.
- ❖ Insuficiencia hepática grave o enfermedad hepática terminal.
- ❖ Insuficiencia renal grave o enfermedad renal terminal que precise diálisis

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

- ❖ Dispepsia, náuseas, diarrea, vómitos, dolor abdominal.
- ❖ Erupción cutánea, prurito, eritema, sequedad de la piel, quemaduras.
- ❖ Cansancio y astenia.
- ❖ Reacción por fotosensibilidad (**use protección solar y evite la exposición al sol o rayos UVA**)
- ❖ Mareo, dolor de cabeza, somnolencia, alteración del gusto.
- ❖ Mialgia, artralgia.
- ❖ Infección de las vías respiratorias altas; infección de las vías urinarias.
- ❖ Disnea, tos, sofocos, pérdida de peso.

Si desarrolla angioedema (hinchazón de cara, labios y lengua) debe suspender inmediatamente el tratamiento.



ADVERTENCIAS

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:



Tomar otros medicamentos y Esbriet

Pirfenidona puede interactuar con otros medicamento, haciendo que no funcionen correctamente o que empeoren sus posibles efectos adversos.

- ❖ De evitarse el zumo de pomelo mientras dure el tratamiento.
- ❖ El consumo de fluvoxamina está contraindicado.
- ❖ Si está tomando ciprofloxacino u omeprazol puede que necesite un ajuste de dosis.
- ❖ No fume ni antes, ni durante el tratamiento.



Embarazo y lactancia

- ❖ Solamente se debe utilizar durante el embarazo o la lactancia si el beneficio justifica el riesgo.



Otras advertencias de interés

- ❖ En ningún caso se recomiendan dosis superiores a 2.403 mg/día (3 comp. de 801 mg)
- ❖ **Use protección solar y evite la exposición al sol o rayos UVA.**



Conducción

Esbriet puede causar **mareo y cansancio**, lo que puede tener una influencia moderada sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

Tenga precaución cuando conduzca o utilice máquinas si experimentan estos síntomas.



¿Puedo tomar bebidas alcohólicas?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interactuar con algunos de los medicamentos que está tomando

RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.

Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91-6839360

- Cambio de cita: 2623/6348

- Resolución de dudas: 2458/2620/2025

Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas



Hospital Universitario
de Getafe

Comunidad de Madrid