



CRESEMBA 100 MG CÁPSULAS ISAVUCONAZOL.

¿Qué es y para qué se utiliza?

Cresemba® contiene extractos de isavuconazol, un medicamento antifúngico, es decir, actúa matando o deteniendo el crecimiento del hongo que provoca la infección.

Cresemba está indicado como tratamiento de las siguientes infecciones fúngicas: aspergilosis invasiva, provocada por un hongo del grupo 'Aspergillus' y mucormicosis, provocada por un hongo perteneciente al grupo 'Mucorales', en pacientes en los que un tratamiento con anfotericina B no es apropiado.

¿Cómo se toma?

| Medicamento | Pauta | Cómo tomarlo |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Isavuconazol | <ul style="list-style-type: none"> - Inicio: 200mg/8h durante dos días (en total 6 tomas de 2 cápsulas cada una) - Mantenimiento: 200 mg/24h | Puede tomarse con o sin comida. Tragar las cápsulas enteras. |



Es muy importante que no deje de tomar su tratamiento y recuerde tomarlo siempre en el mismo momento del día.

¿Y si se me olvida alguna toma?

Tome las cápsulas en cuanto lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la siguiente dosis, omita la dosis olvidada.

¿Cómo conservarlo?

Conserve este medicamento a temperatura ambiente ($T^a < 25^{\circ}C$)



CONTRAINDICACIONES



- ❖ Alergia a alguno de los componentes.
- ❖ Pacientes con un problema cardíaco llamado "Síndrome de QT corto"

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Los efectos adversos más frecuentes son::

- Concentraciones reducidas de potasio en la sangre,
- disminución del apetito,
- alucinaciones (delirios),
- dolor de cabeza,
- somnolencia,
- venas inflamadas que pueden provocar coágulos de sangre,
- falta de aire o problema respiratorio repentino y grave,
- náuseas, vómitos, diarrea y dolor de estómago,
- cambios en los análisis de sangre de la función hepática,
- erupción cutánea, picor,
- insuficiencia renal,
- dolor torácico, sentirse cansado o somnoliento

Avisé a su médico en caso de erupción cutánea, hinchazón de los labios, boca, lengua o garganta con dificultad para respirar, formación de ampollas grave de la piel, boca, ojos o genitales.

Consulte a su médico o farmacéutico para más información.



ADVERTENCIAS



No tome **Cresemba®** conjuntamente con:

- ❖ ketoconazol, usado para infecciones fúngicas,
- ❖ rifampicina, rifabutina, usados para la tuberculosis,
- ❖ carbamazepina, usada para la epilepsia,
- ❖ barbitúricos como fenobarbital, usado para la epilepsia y trastornos del sueño,
- ❖ fenitoína, usada para la epilepsia,
- ❖ hierba de san juan, un medicamento a base de plantas usado para la depresión,
- ❖ efavirenz, etravirina, usados para el VIH,
- ❖ nafcilina, usado para infecciones bacterianas.

Cresemba puede interactuar con otros medicamentos que pueden disminuir su eficacia o aumentar su toxicidad. Consulte con su farmacéutico cualquier otro tratamiento que esté tomando mientras está en tratamiento con Cresemba.



Embarazo y lactancia

Como medida de precaución, **es preferible evitar el uso de isavuconazol durante el embarazo** a no ser que el posible beneficio para la madre supere de manera irrefutable el posible riesgo que supone para el feto.

Tampoco debe usarse durante la lactancia.



Conducción

Cresemba puede hacerle sentir confuso, cansado o somnoliento. También puede provocar desmayos. Tenga precaución si conduce o utiliza máquinas.



¿Puedo tomar bebidas alcohólicas con Cresemba?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interactuar con algunos de los medicamentos que está tomando.

RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.

Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91-6839360

- Cambio de cita: 2623/6348

- Resolución de dudas: 2458/2620/2025

Horario:

- Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h
- Lunes a jueves de 16 a 19 horas

Para CAMBIOS DE CITA o RESOLUCIÓN DE DUDAS escanee este código QR



Para consultar otra información de nuestra Página Web escanee este Código QR

