



## THYROGEN 0,9 MG POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Junto con la determinación sérica de tiroglobulina (Tg) con o sin toma de imágenes con yodo radioactivo, para la detección de restos tiroideos y de cáncer de tiroides bien diferenciado en pacientes tiroidectomizados en tratamiento con terapia de supresión hormona.

### ¿Cómo se toma?

Medicamento	Pauta	Cómo administrarlo
Tirotropina alfa	2 dosis de 0,9 en un intervalo de 24 horas	Inyección intramuscular (Glúteo) Administrada en su centro de salud por personal de enfermería.

## ENTREGUE ESTE FOLLETO INFORMATIVO AL PERSONAL SANITARIO ENCARGADO DE ADMINISTRAR LA MEDICACIÓN



### ¿Cómo reconstituir el vial?

**Solo se requiere un vial de Thyrogen por inyección. Cada vial de Thyrogen es para un solo uso.**

- ✓ Añadir 1,2 ml de agua para preparaciones inyectables al vial que contiene el polvo de Thyrogen.
- ✓ Girar suavemente el vial hasta que se disuelva todo el contenido. No agitar la solución.
- ✓ Cuando el polvo esté disuelto, el volumen total del vial será de 1,2 ml.
- ✓ Inspeccionar visualmente para detectar la presencia de partículas extrañas y alteraciones del color. La solución de Thyrogen debe ser transparente e incolora. No utilizar los viales que contengan partículas extrañas, que presenten turbidez o alteración del color.
- ✓ Extraer 1,0 ml de la solución de Thyrogen del vial. Esto equivale a 0,9 mg de tirotropina alfa.
- ✓ La solución de Thyrogen debe inyectarse dentro de las tres horas siguientes a su reconstitución.



### ¿Cómo conservar esté medicamentos?

**Conservar entre 2 y 8º C.**

La solución reconstituida se puede conservar hasta 24 horas a una temperatura entre 2º C y 8º C, protegida de la luz y evitando la contaminación bacteriana.

### CONTRAINDICACIONES



- ❖ Hipersensibilidad a la hormona estimulante del tiroides de procedencia bovina o humana o a alguno de los excipientes incluidos
- ❖ Contraindicado en embarazo.
- ❖ No usar durante la lactancia.

### POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Es probable que no todos o ninguno de los siguientes efectos adversos aparezcan durante el tratamiento. Avise a su médico si nota cualquiera de estos síntomas u cualquier otro no mencionado aquí :

- Los más frecuentes son: Náuseas, vómitos. Fatiga, astenia. Dolor de cabeza, mareos.
- Otros efectos adversos son: Disgeusia, parestesia. Erupción, urticaria. Síndrome pseudogripal. Diarrea. Dolor de espalda.

## ADVERTENCIAS

Para la determinación de tiroglobulina (Tg) sérica, la muestra debe obtenerse 72h después de la última inyección de Thyrogen.

*Consulte a su médico o farmacéutico en caso de:*



### Tomar otros medicamentos y

No se han realizado estudios formales de interacción entre Thyrogen y otros fármacos. NO se observaron interacciones entre Thyrogen y las hormonas tiroideas triyodotironina (T<sub>3</sub>) y tiroxina (T<sub>4</sub>) al administrarlos simultáneamente.



### Embarazo y lactancia

No se sabe si Thyrogen puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada o si puede afectar a la capacidad reproductora.

Thyrogen en combinación con un rastreo corporal con yodo radioactivo, está contraindicado durante el embarazo, debido a la exposición del feto a una alta dosis de material radioactivo.

Thyrogen no debe utilizarse durante la lactancia.



### Conducción

Thyrogen puede reducir la capacidad de conducir o utilizar máquinas, ya que se han notificado casos de mareos y dolores de cabeza.



### ¿Puedo tomar bebidas alcohólicas con Dovato?

Evite el consumo excesivo o regular de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de hepatitis (inflamación del hígado) o interactuar con algunos de los medicamentos que está tomando

## RECUERDE

- ❖ Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no deben tomarlo otras personas, aunque presenten los mismos síntomas, sin que las vea un médico.
- ❖ Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ Conserve este folleto. Contiene información útil sobre los medicamentos que usted toma.
- ❖ Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños
- ❖ Devuelva la medicación sobrante al Servicio de Farmacia del hospital.
- ❖ No usar el medicamento después de superada la fecha de caducidad indicada en el envase.
- ❖ En caso de **Intoxicación o sobredosis**, acuda inmediatamente a urgencias y/o llame al Servicio de Información Toxicológica: 91-562-04-20

**Si tiene dudas sobre la información contenida en este folleto o si desea ayuda para planificar la toma de su medicación, no dude en consultarnos.**

## Consulta de Atención Farmacéutica

Teléfonos de contacto: 91 683 93 60

Cambio de cita: 2623/6348

Resolución de dudas: 2458/2620/2025

**Horario:**

Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h

Lunes a jueves de 16 a 19 horas.

