



SERVICIO DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA

INFORMACIÓN PARA PACIENTES

Recuerde que ante cualquier duda deberá ponerse en contacto con la unidad para evaluar su situación y decidir las recomendaciones más apropiadas para facilitar su recuperación postoperatoria.

SERVICIO DE UROLOGÍA

INSTRUCCIONES PARA DESPUES DE LA BIOPSIA DE LA PROSTATA

- Se le acaba de realizar una biopsia de la próstata, es normal que presente alguno o todos los siguientes síntomas o signos:
 1. Dolor en región anal, generalmente moderado que cederá espontáneamente en algunas horas. Puede tomar el analgésico que tenga en su casa, excepto aspirina (ácido acetilsalicílico).
 2. Sangrado por el recto al defecar (generalmente de poca cuantía), hematuria (sangre con la orina) y hemospermia (sangre en el semen al eyacular). Estas alteraciones son habituales después de la biopsia y desaparecen espontáneamente.
- Deberá de tomar con un poco de agua la otra cápsula de antibiótico que se le suministró.
- Puede hacer vida normal.
- Si presentara dolor anal muy importante, fiebre alta ($> 38,5^{\circ}$), sangrado abundante por el recto o con la orina o imposibilidad para orinar deberá de acudir al Servicio de Urgencias.

Acudirá al Pabellón de Consultas Externas de este Hospital (C/ Dr. Castelo) de 8 a 15h para que le citen en la consulta.