

Certolizumab

(CIMZIA® jeringa precargada)



Servicio de Farmacia
HGU Gregorio Marañón

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Certolizumab es un inhibidor del TNF- α que actúa disminuyendo la inflamación en enfermedades crónicas autoinmunes como **artritis reumatoide**, **artritis psoriásica**, **espondilitis anquilosante** y **espondiloartritis axial no radiológica**.


CÓMO ADMINISTRARLO



Certolizumab se debe administrar por **vía subcutánea** los días que le indique su médico.

Saque la jeringa de la nevera media hora antes de la administración.

Se recomienda variar el lugar en cada administración para evitar que la piel se irrite.



CÓMO CONSERVARLO



Conserve la medicación en la **nevera** (NUNCA en el congelador) y en su caja para protegerlo de la luz.

Una vez utilizadas las **jeringas**, tírelas al **contenedor** que le hemos dado en la Farmacia del Hospital. Cuando esté lleno a 2/3 de su capacidad, ciérrelo bien y entréguelo en la Farmacia para su adecuada destrucción.

QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA



Si se olvida una dosis, adminístresela tan pronto como sea posible y continúe con su calendario habitual.

Si la dosis olvidada está más próxima a la siguiente administración, consulte con su médico cuándo administrarla. Intente administrarse la medicación siempre a la misma hora para evitar olvidos.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



- En el punto de la piel donde ha inyectado la medicación puede aparecer **hematoma**, **calor**, **dolor**, **prurito** y/o **eritema**
- Durante el tratamiento con certolizumab podrían aparecer con frecuencia (>1%): **infecciones bacterianas y víricas**, dolores de cabeza (incluyendo migraña), astenia, alteraciones sensitivas, hipertensión, náuseas, exantema, alteraciones hematológicas como leucopenia o aumento de transaminasas.
- Certolizumab afecta al sistema inmunitario pudiendo afectar a las defensas del paciente frente a infecciones, neoplasias o a la respuesta adecuada a determinadas vacunas. Antes del inicio de tratamiento deben ser descartadas infecciones latentes como tuberculosis o hepatitis B. Debe acudir a su médico o a Urgencias si presenta **síntomas de infección** (fiebre, tos persistente...) durante el tratamiento.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO SI:



- Está o planea quedarse embarazada, o si es madre lactante.
- Tiene alguna enfermedad del corazón.
- Tiene programada alguna operación quirúrgica o cita con su dentista.
- Tiene que vacunarse.

Y RECUERDE...

- Comunique a su médico o farmacéutico todo medicamento que esté tomando, con o sin receta, suplemento dietético o producto natural.
- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia del Hospital.
- Certolizumab se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarles aunque tengan síntomas similares a los suyos.
- Mantenga este medicamento y el contenedor de agujas fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Para recoger su medicación es necesario presentar la Tarjeta Sanitaria y la receta en vigor (revise que la fecha de validez sea posterior al día en curso, en caso contrario deberá acudir a su médico para que le renueve la receta).
- Podrá recoger medicación hasta 5 días antes de la fecha que se le haya indicado en su receta.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

NO SE QUEDE CON DUDAS. PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.



Servicio de Farmacia
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

Comunidad de Madrid

@farma_gregorio