

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Daclatasvir es un medicamento antiviral que está indicado, en combinación con otros medicamentos, en el **tratamiento de la infección por el VHC**.

CÓMO TOMARLO



Daklinza® se debe tomar por vía oral una vez al día. Tome los comprimidos enteros **CON alimentos**.

Los comprimidos no se deben triturar

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible con alimentos, a no ser que quede menos de 4 h para la siguiente dosis programada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. **Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.**

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **fatiga** o **cansancio**, **dolor de cabeza** y **náuseas**. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE REACCIONES ADVERSAS ...



Picor y/o sequedad en la piel: Utilice jabones neutros y cremas hidratantes/emolientes. Evite duchas demasiado calientes. Evite la exposición al sol. Beba abundantes líquidos para hidratar la piel.

Cansancio: Intente realizar sus actividades cotidianas. No conduzca ni utilice máquinas peligrosas

Náuseas y/o diarrea: Intente comer menos cantidades en más tomas durante el día. Evite las comidas muy calientes, grasas y/o con picantes. No tome café o bebidas con cafeína. Evite acostarse justo después de haber comido (espere al menos 1 hora)

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

Se debe evitar un embarazo durante el tratamiento y hasta 5 semanas después de finalizarlo. Evite la lactancia materna.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



A **Tª ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.

Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

Y RECUERDE...

- Para **evitar la transmisión a través de la sangre o contacto sexual**, debe seguir tomando las precauciones apropiadas.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.** La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Acuda el día y a la hora de su cita programada. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	De	Co	Ce	
Daklinza®	mg	comprimidos		CON alimentos

NO SE QUEDE CON DUDAS. PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

