

RILPIVIRINA

EDURANT® 25 mg comprimidos



Servicio de Farmacia
HGU Gregorio Marañón

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Rilpivirina es un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el [tratamiento de la infección por el VIH](#).

CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico / farmacéutico. Debe tomarse **CON ALIMENTOS** para alcanzar las concentraciones correctas del principio activo en su cuerpo. Una bebida nutricional (por ejemplo, rica en proteínas) no reemplaza a una comida. No masticar ni triturar el comprimido.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela con una comida tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

CÓMO CONSERVARLO



A **Tª ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: [trastornos del sueño](#), [dolor de cabeza](#), [mareo](#), [náuseas](#), [pérdida de apetito](#), [cansancio](#) y [erupción cutánea](#). Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

¡ATENCIÓN!



- Los comprimidos contienen lactosa. Informe a su médico o farmacéutico si presenta intolerancia a la lactosa u otros azúcares.
- Comunique [cualquier medicamento \(incluso los adquiridos sin receta\)](#), [suplemento dietético](#) o [producto natural](#) que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de rilpivirina. Rilpivirina no debe administrarse conjuntamente con algunos medicamentos para tratar las úlceras de estómago/ intestino o aliviar el ardor de estómago como son los inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol). Sí puede tomarse con otros fármacos como la ranitidina si se toma 12 horas antes o 4 horas después de rilpivirina, y con antiácidos (p. ej., hidróxido de aluminio o magnesio, carbonato cálcico) si éstos se toman 2 horas antes o 4 horas después de rilpivirina. La administración de rilpivirina con dexametasona, dabigatrán (anticoagulante) e Hierba de San Juan está contraindicada. También es especialmente importante que mencione el uso concomitante de antibióticos y antiepilépticos.
- Si está embarazada, comuníquesele inmediatamente a su médico. Las mujeres embarazadas no deben tomar rilpivirina, salvo que se lo indique específicamente el médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Y RECUERDE...

- Tomar esta medicación **no elimina el virus ni evita la transmisión a través de la sangre o contacto sexual**. Debe seguir tomando las precauciones apropiadas.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	De	Co	Ce	
Edurant® 25 mg comp				CON alimentos

**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 91 586 7714 www.madrid.org/hospitalgregoriomaranon/farmacia



Servicio de Farmacia
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

Comunidad de Madrid

@farma_gregorio