

ETRAVIRINA

INTELENCE® 200 mg comprimidos



Servicio de Farmacia
HGU Gregorio Marañón

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Etravirina es un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el [tratamiento de la infección por el VIH](#).

CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico / farmacéutico. Debe tomarse **CON ALIMENTOS** para alcanzar las concentraciones correctas del principio activo en su cuerpo. Si tiene dificultades para tragar los comprimidos enteros, puede disolverlos en un vaso de agua y beberlo inmediatamente.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela con una comida tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

CÓMO CONSERVARLO



A **Tª ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: [erupciones en la piel](#), [náuseas](#) y [diarrea](#). Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

¡ATENCIÓN!



- Los comprimidos contienen lactosa. Informe a su médico o farmacéutico si presenta intolerancia a la lactosa u otros azúcares.
- Comunique [cualquier medicamento \(incluso los adquiridos sin receta\)](#), [suplemento dietético](#) o [producto natural](#) que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de etravirina. Es especialmente importante que mencione si está tomando antibióticos como la [claritromicina](#), anticoagulantes como la [warfarina](#), corticosteroides como la [dexametasona](#) y fármacos para disminuir el colesterol como las [estatinas](#). La administración de etravirina con [clopidogrel](#), [rifampicina](#) y/o [Hierba de San Juan](#) está contraindicada.
- Las mujeres en edad fértil deben utilizar un [método anticonceptivo eficaz](#) durante el tratamiento con etravirina. Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Y RECUERDE...

- Tomar esta medicación **no elimina el virus ni evita la transmisión a través de la sangre o contacto sexual**. Debe seguir tomando las precauciones apropiadas.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
Intelence® 200 mg comp	Desayuno	Comida	Cena	Después de la toma de los alimentos

**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 91 586 7714 www.madrid.org/hospitalgregoriomarañon/farmacia



Servicio de Farmacia
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón
Comunidad de Madrid
@farma_gregorio