

LOPINAVIR/RITONAVIR

KALETRA® 100/25 mg comprimidos

KALETRA® 200/50 mg comprimidos

KALETRA® (80 mg + 20 mg)/mL solución oral



Servicio de Farmacia
HGU Gregorio Marañón

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Lopinavir es un inhibidor de la proteasa que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el **tratamiento de la infección por el VIH**. Ritonavir se utiliza como potenciador del efecto de lopinavir.

CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico / farmacéutico.
Comprimidos: tómelos enteros, **CON o SIN ALIMENTOS**. Los comprimidos no se pueden machacar ni triturar.
Solución: tómela siempre **CON ALIMENTOS** (estómago lleno).

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

CÓMO CONSERVARLO



Comprimidos: a **Tª ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.
Solución: en **nevera** (entre 2º C y 8º C). Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **trastornos gastrointestinales** (diarrea, náuseas, flatulencia, disminución el apetito), **aumento leve del colesterol, triglicéridos y azúcar en sangre, mareo, cansancio y dolor de cabeza**. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

¡ATENCIÓN!



- La solución contiene fructosa. Informe a su médico o farmacéutico si padece una intolerancia a ciertos azúcares.
- Comunique **cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural** que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de lopinavir/ritonavir. Es especialmente importante que mencione el uso de medicamentos para reducir el colesterol en sangre (como lovastatina, simvastatina, atorvastatina o rosuvastatina), sildenafil u otros medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil, medicamentos para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, asma u otros problemas relacionados con los pulmones, medicamentos para el corazón (como digoxina o nifedipino), anticonceptivos, inmunosupresores, antibióticos y antifúngicos, antiepilépticos, anticoagulantes, antipsicóticos y antidepresivos. No tome Hierba de San Juan durante el tratamiento.
- Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo **NO HORMONAL** eficaz, ya que la efectividad de los anticonceptivos hormonales puede verse reducida. Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Y RECUERDE...

- Tomar esta medicación **no elimina el virus ni evita la transmisión a través de la sangre o contacto sexual**. Debe seguir tomando las precauciones apropiadas.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	De	Co	Ce	
Kaletra® 100/25 mg comp				CON o SIN alimentos
Kaletra® 200/50 mg comp				CON o SIN alimentos
Kaletra® solución				CON alimentos

**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

