

DARUNAVIR

PREZISTA® 600 mg comprimidos

PREZISTA® 800 mg comprimidos



Servicio de Farmacia
HGU Gregorio Marañón

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Darunavir es un inhibidor de la proteasa que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el **tratamiento de la infección por el VIH**.

CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico / farmacéutico. Habitualmente se toma con ritonavir (Norvir®). En ese caso, **ambos fármacos deben tomarse juntos**.

Tome los comprimidos enteros **CON ALIMENTOS** (estómago lleno). No es recomendable masticar, machacar o partir los comprimidos.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

CÓMO CONSERVARLO



A **Tª ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **trastornos gastrointestinales (diarrea, vómitos), cefalea, cansancio, aumento leve del colesterol, triglicéridos y azúcar en sangre, erupción de la piel y aumento de sangrado en pacientes hemofílicos**.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

¡ATENCIÓN!



- Comuníquese a su médico o farmacéutico si presenta **alergia a sulfonamidas**.
- Comuníquese **cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural** que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de darunavir. Es especialmente importante que mencione el uso de medicamentos para reducir el colesterol en sangre (como lovastatina o simvastatina), sildenafil u otros medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil, anticonceptivos, inmunosupresores, antifúngicos, antiepilépticos, anticoagulantes y medicamentos para el tratamiento de la alergia o asma.
- Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo **NO HORMONAL** eficaz, ya que la efectividad de los anticonceptivos hormonales puede verse reducida. Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Y RECUERDE...

- Tomar esta medicación **no elimina el virus ni evita la transmisión a través de la sangre o contacto sexual**. Debe seguir tomando las precauciones apropiadas.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	Desayuno	Comida	Cena	
Prezista® 600 mg comp				Después de la toma de los alimentos. Si tiene prescrito también Norvir®, tome juntos ambos medicamentos.
Prezista® 800 mg comp				

**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 91 586 7714 www.madrid.org/hospitalgregoriomarañon/farmacia



Servicio de Farmacia
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

SaludMadrid
@farma_gregorio

Comunidad de Madrid