

DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINA

TRIUMEQ® 50/600/300 mg comprimidos



Servicio de Farmacia
HGU Gregorio Marañón

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Triumeq es una combinación antirretroviral compuesta por Dolutegravir + Abacavir + Lamivudina que se utiliza para el **tratamiento de la infección por el VIH**.

CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico / farmacéutico. Tome los comprimidos enteros. No es recomendable masticar, machacar o partir los comprimidos. Puede tomarlos **CON** o **SIN** alimentos.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que queden menos de 4 horas para la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

CÓMO CONSERVARLO



A **Tª ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **dolor de cabeza, diarrea, náuseas, trastornos del sueño, mareo y cansancio**. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

¡ATENCIÓN!



▪ **Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.**

▪ Este medicamento no debe administrarse conjuntamente con **antiácidos** que contengan aluminio / magnesio (empleados para tratar la indigestión o el ardor de estómago), **suplementos de calcio o hierro** y preparados **multivitamínicos**. En caso de necesidad, tómelos al menos 6 horas antes de tomar Triumeq o por lo menos 2 horas después de tomarlo.

La administración de Triumeq con **dofetilida** (antiarrítmico) e **Hierba de San Juan** está contraindicada. También es especialmente importante que mencione el uso concomitante de **antiepilépticos** como la oxcarbamazepina, carbamazepina, fenitoína o fenobarbital y **antidiabéticos** como la metformina.

▪ **REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD:** Este medicamento puede producir una reacción alérgica grave. Usted tiene más probabilidad de desarrollarla si tiene un gen llamado HLA-B*5701 (pero puede sufrir dicha reacción incluso si no tiene este gen). Antes de iniciar el tratamiento, le deberían haber realizado la prueba de detección de este gen. Si sabe que tiene este gen, dígaselo a su médico antes de tomarlo. Esta reacción suele ocurrir en las primeras 6 semanas de tratamiento y **empeora al continuarlo**. **Consulte a su médico INMEDIATAMENTE si nota cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, erupción cutánea, enrojecimiento y/o picores, náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal, cansancio, malestar general, respiración entrecortada, dolor de garganta o tos. Si su médico interrumpe el tratamiento por sospecha de hipersensibilidad, JAMÁS vuelva a tomarlo.**

Es importante tomar Triumeq® de forma regular dado que la ingesta irregular incrementa el riesgo de reacciones de hipersensibilidad. El envase de este medicamento contiene una tarjeta informativa sobre esta reacción alérgica, que debe separar y llevar consigo.

Si por cualquier motivo ha dejado de tomarlo, es importante que se ponga en contacto con su médico antes de reiniciar el tratamiento.

▪ Si está embarazada, comuníquesele inmediatamente a su médico. Las mujeres embarazadas no deben tomar Triumeq®, salvo que se lo indique específicamente el médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Y RECUERDE...

- Tomar esta medicación **no elimina el virus ni evita la transmisión a través de la sangre o contacto sexual**. Debe seguir tomando las precauciones apropiadas.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO DE MEDICACIÓN

DOSIS

CÓMO TOMARLO

De Co Ce

Triumeq® comp

CON o SIN alimentos

**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

