

EMTRICITABINA/TENOFOVIR

TRUVADA® 200/245 mg comprimidos



Servicio de Farmacia
HGU Gregorio Marañón

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Truvada® es una combinación de dos fármacos antirretrovirales, inhibidores de la transcriptasa inversa, que están indicados en el [tratamiento de la infección por el VIH](#).

CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico / farmacéutico. Tome los comprimidos **CON ALIMENTOS** (estómago lleno). Si tiene dificultad para tragar, puede deshacer el comprimido en un poco de agua, zumo de naranja o uva y tomarlo inmediatamente.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

CÓMO CONSERVARLO



A **Tª ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: [diarrea](#), [náuseas](#), [vómitos](#), [mareos](#), [dolor de cabeza](#), [erupción](#) y [sensación de debilidad](#). Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

¡ATENCIÓN!



- Los comprimidos contienen lactosa. Informe a su médico o farmacéutico si padece intolerancia a la lactosa u otros azúcares.
- Comunique [cualquier medicamento \(incluso los adquiridos sin receta\)](#), [suplemento dietético](#) o [producto natural](#) que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de Truvada®.
- Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Se debe evitar la lactancia materna.

Y RECUERDE...

- Tomar esta medicación **no elimina el virus ni evita la transmisión a través de la sangre o contacto sexual**. Debe seguir tomando las precauciones apropiadas.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	De	Co	Ce	
Truvada® 200/245 mg comp				CON alimentos

**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

