

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Abatacept es un fármaco modulador de la estimulación selectiva de los linfocitos T (sistema inmunitario) y actúa disminuyendo la inflamación en enfermedades crónicas como **artritis reumatoide**.


CÓMO ADMINISTRARLO



Abatacept se debe administrar por **vía subcutánea** los días que le indique su médico.

Saque la jeringa de la nevera media hora antes de la administración.

Se recomienda variar el lugar en cada administración para evitar que la piel se irrite.



CÓMO CONSERVARLO



Conserve la medicación en la **nevera** (NUNCA en el congelador) y en su caja para protegerlo de la luz.

Una vez utilizadas las **jeringas**, tírelas al **contenedor** que le hemos dado en la Farmacia del Hospital. Cuando esté lleno a 2/3 de su capacidad, ciérrelo bien y entréguelo en la Farmacia para su adecuada destrucción.

QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA



Si se administra abatacept cada 7 días, ha olvidado la dosis y han pasado menos de 3 días de la fecha debida, póngasela inmediatamente y mantenga su pauta original. Si han pasado más de 3 días, póngasela inmediatamente y contacte con su médico o farmacéutico.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



- En el punto de la piel donde ha inyectado la medicación puede aparecer **hematoma, calor, dolor, prurito y/o eritema**
- Es muy frecuente (>10%) la aparición de **infecciones de vías respiratorias superiores incluyendo traqueítis, nasofaringitis**. También podrían aparecer aunque con menor frecuencia (>1%): infecciones de vías respiratorias inferiores (incluyendo bronquitis), vías urinarias, infecciones por herpes, rinitis, neumonía y/o gripe; **cefalea**, mareo, parestesia, conjuntivitis, hipertensión, rubor, tos, dolor abdominal, diarrea, **náuseas**, dispepsia, úlceras bucales, estomatitis aftosa, vómitos, aumento transaminasas, erupción cutánea, alopecia, prurito, dolor en extremidades, fatiga y astenia.
- Abatacept afecta al sistema inmunitario pudiendo afectar a las defensas del paciente frente a infecciones, neoplasias o a la respuesta adecuada a determinadas vacunas. Antes del inicio de tratamiento deben ser descartadas infecciones latentes como tuberculosis o hepatitis B. Debe acudir a su médico o a Urgencias si presenta **síntomas de infección** (fiebre, tos persistente, debilidad, pérdida de peso...) durante el tratamiento con abatacept. Debe avisar a su médico antes de ponerse una **vacuna**.
- No se debe utilizar abatacept durante el embarazo. Se debe utilizar anticoncepción efectiva y evitar la lactancia materna durante el tratamiento y hasta 14 semanas después de la última dosis.

Y RECUERDE...

- Comunique a su médico o farmacéutico todo medicamento que esté tomando, con o sin receta, suplemento dietético o producto natural.
- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia del Hospital.
- Abatacept se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarles aunque tengan síntomas similares a los suyos.
- Mantenga este medicamento y el contenedor de agujas fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Para recoger su medicación es necesario presentar la Tarjeta Sanitaria y la receta en vigor (revise que la fecha de validez sea posterior al día en curso, en caso contrario deberá acudir a su médico para que le renueve la receta).
- Podrá recoger medicación hasta 5 días antes de la fecha que se le haya indicado en su receta.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

NO SE QUEDE CON DUDAS. PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

