

CARVEDILOL

Suspensión 0,5 mg/ml

Frasco de 50 ml

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Su médico se lo ha pautado para tratar la **insuficiencia cardiaca** (capacidad del corazón para realizar su función de bombeo).

CÓMO LO ELABORAMOS



Carvedilol50 mg
 Agua destilada.....65 ml
 Sorbitol 70%.....45.5 g
 Excipientes: contiene sorbitol 245 mg/ml y lactosa

CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico.
 Se puede tomar **con o sin alimentos**, aunque los alimentos disminuyen el riesgo de que se presenten mareos al levantarse. Intente tomarlo siempre a la misma hora.
Agite bien la suspensión antes de administrarlo.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada.
 En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.
 Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Los efectos adversos más frecuentes son: dolor de cabeza, mareos, cansancio, fatiga, náuseas, diarrea. Si estas reacciones se vuelven severas consúlteselo a su médico.
 Avise a su médico inmediatamente si sufre dificultad para respirar, síntomas de alergia y sangrados.
 Por contener **glicerol** como excipiente puede provocar, en dosis elevadas, dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.
 Si aprecia cualquier efecto adverso que no hemos mencionado informe a su médico.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



Conservar **en nevera** y protegido de la luz.
 Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

Y RECUERDE...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	Desayuno	Comida	Cena	
Carvedilol				Con/sin alimentos



**NO SE QUEDE CON DUDAS.
 PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

