

CLORHEXIDINA 0,02%

Colirio 10 mL

Fórmula magistral

QUÉ ES



Composición por 10 mL

Digluconato de clorhexidina 20%	0,01 mL
Ácido acético 3-H ₂ O	180 mg
Ácido bórico	19 mg
Agua para inyección	csp 10 mL

PARA QUÉ SE UTILIZA



Se utiliza para el tratamiento de la queratitis producida por *Acanthamoeba keratitis* y como antiséptico en cirugía oftalmológica.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA ADMINISTRACIÓN



Adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, espere a la siguiente administración. Nunca se lo administre dos veces para compensar el olvido.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Puede notar picor, enrojecimiento, visión borrosa, sensación de tener algo en el ojo o secreción excesiva de lágrimas. Comuníquelo a su médico si estos efectos persisten o empeoran. En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica).

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Si tiene alergia a algún medicamento o está utilizando algún otro tratamiento ocular (lágrimas artificiales etc).

Se considera seguro su uso durante el embarazo y la lactancia.


CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



Debe conservarlo en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, escribir la fecha de apertura y desechar el envase a los 7 días. No utilice el colirio después de la fecha de caducidad que figura en el envase.

Y RECUERDE...

- **Para administrarlo**, lávese las manos y colóquese frente al espejo. Agite suavemente el colirio. No toque el gotero ni lo ponga en contacto con su ojo. Eche la cabeza hacia atrás, sujete el párpado inferior y ponga el gotero justo por encima del ojo sin tocarlo. Administre la dosis prescrita.
- **Tras la administración**, cierre los ojos durante 1-2 minutos. Limpie con una gasa estéril el colirio que no entre y no se frote los ojos. Si tiene otro tratamiento ocular, espere al menos 15 minutos entre administraciones.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con el colirio **lave la zona con agua** abundante.
- Nuestro horario de atención es de **lunes a jueves, de 8:30 a 18:30h y viernes de 8:30 a 14:30h**.
- Si va a continuar el tratamiento, le pedimos que nos avise siempre con **3 días de antelación** a la recogida de la medicación para programar la elaboración en el 91 586 8245.



HORARIO DE MEDICACIÓN

DOSIS

**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

