

# DILTIAZEM

## Suspensión 10 mg/ml

### Frasco de 50 ml

#### QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Su médico se lo ha pautado para controlar su **presión arterial**.

#### CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico. Se puede tomar **con o sin alimentos**. Intente tomarlo siempre a la misma hora.

**Agite** bien la suspensión antes de administrarlo.

Si toma **antiácidos** separar 2 horas su administración.

#### QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

#### QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Los efectos secundarios más frecuentes son: enrojecimiento de cara y cuello, mareos al levantarse, náuseas, dolor de cabeza, cansancio. Si estas reacciones se vuelven severas consúlteselo a su médico.

Avise a su médico inmediatamente si sufre, dificultades respiratorias, reacción alérgica, fiebre, latido cardíaco irregular, vértigos, inflamación de pies y tobillos.

Este medicamento por contener **glicerol** como excipiente puede provocar, a dosis elevadas, dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

#### COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

#### CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



Conservar **en nevera**. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

#### Y RECUERDE...

- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

#### CÓMO LO ELABORAMOS



Diltiazem.....1 g  
Ora Sweet.....50 ml  
Ora Plus.....50 ml

Excipientes:  
este medicamento contiene  
sacarosa 350 mg/mL, glicerol y  
sorbitol

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
Diltiazem	Desayuno	Comida	Cena	Con/sin alimentos, pero siempre de la misma forma.



**NO SE QUEDE CON DUDAS.  
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

*En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.*

