

EMTRICITABINA/TENOFOVIR/RILPIVIRINA EVIPLERA® 200/245/25 mg comprimidos



Servicio de Farmacia
HGU Gregorio Marañón

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Eviplera® contiene tres principios activos que se utilizan en el **tratamiento de la infección por el VIH**. Cada uno de estos principios activos actúa interfiriendo con una enzima (denominada "transcriptasa inversa") que es esencial para la multiplicación del virus.

CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico / farmacéutico. Debe tomarse **CON ALIMENTOS** para alcanzar las concentraciones correctas del principio activo en su cuerpo. Una bebida nutricional (por ejemplo, rica en proteínas) no reemplaza a una comida. No masticar ni triturar el comprimido.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela con una comida tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

CÓMO CONSERVARLO



A **Tª ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **trastornos del sueño, dolor de cabeza, mareo, náuseas, pérdida de apetito, cansancio y erupción cutánea**. Esté atento a la aparición de signos y síntomas importantes de acidosis láctica, entre los que se encuentran: respiración rápida y profunda, cansancio o sopor, náuseas y vómitos y dolor de estómago. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

¡ATENCIÓN!



- Los comprimidos contienen lactosa y laca de aluminio amarillo anaranjado S/E110. Informe a su médico o farmacéutico si presenta intolerancia a estos excipientes.
- Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural** que esté tomando, pues pueden interferir con el efecto de rilpivirina. Rilpivirina NO debe administrarse conjuntamente con algunos medicamentos para tratar las úlceras de estómago/ intestino o aliviar el ardor de estómago como son los inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol). Sí puede tomarse con otros fármacos como la ranitidina si se toma 12 horas antes o 4 horas después de rilpivirina, y con otros antiácidos (p. ej., hidróxido de aluminio o magnesio, carbonato cálcico) si éstos se toman 2 horas antes o 4 horas después de rilpivirina. La administración de rilpivirina con dexametasona, dabigatrán (anticoagulante) e Hierba de San Juan está contraindicada. También es especialmente importante que mencione el uso concomitante de antibióticos y antiepilépticos.
- Las mujeres no deben quedarse embarazadas mientras estén tomando Eviplera®. Utilice un método eficaz de contracepción. Informe inmediatamente a su médico si se quedara embarazada. Las mujeres embarazadas no deben tomar Eviplera®, salvo que se lo indique específicamente el médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Y RECUERDE...

- Tomar esta medicación **no elimina el virus ni evita la transmisión a través de la sangre o contacto sexual**. Debe seguir tomando las precauciones apropiadas.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	De	Co	Ce	
Eviplera® 200/245/25 mg comp				CON alimentos

**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

