

LAMIVUDINA

(Zeffix® 100 mg comprimidos)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Lamivudina es un antiviral que está indicado, para la profilaxis y el tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB).

CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tomar siempre a la misma hora.
Se puede tomar con o sin alimentos.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible.
Si ya es casi la hora de su siguiente dosis, no tome la dosis que olvidó. Espere y tome la dosis siguiente a la hora habitual.
Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Los más frecuentes son: cansancio, molestias en la garganta, cefalea, molestias de estómago, náuseas, vómitos, diarrea, e incremento de los niveles de enzimas hepáticas y musculares, erupciones cutáneas, calambres y dolores musculares.
Acidosis láctica.

Consulte al médico si presenta: respiración acelerada, dificultad para respirar, náusea persistente, anomalía de los latidos del corazón.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Comunique cualquier medicamento, suplemento dietético o producto natural que esté tomando. Lamivudina interacciona con emtricitabina y cladribina.

Si es intolerante a la lactosa.

Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente. No debe dar el pecho durante el tratamiento.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



A Tª ambiente (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor.
Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.
No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

Y RECUERDE...

- Tomar esta medicación no elimina el virus ni evita la transmisión a través de la sangre o contacto sexual. Debe seguir tomando las precauciones apropiadas.
- Conducción y uso de máquinas:** mareos, cansancio y adormecimiento son reacciones adversas frecuentes que podrían alterar la capacidad para conducir y usar máquinas.
- Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.
- En situación de urgencia o cirugía leve (dentista) informe a su médico de los medicamentos que está tomando.
- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO	DOSIS	CÓMO TOMARLO
Zeffix® 100mg	Desayuno Comida Cena	Con o sin alimento

NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

