

# LAMIVUDINA/ABACAVIR

KIVEXA® 300/600 mg comprimidos



Servicio de Farmacia  
HGU Gregorio Marañón

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Kivexa® es una combinación de dos fármacos antirretrovirales inhibidores de la transcriptasa inversa (abacavir y lamivudina), que están indicados en el **tratamiento de la infección por el VIH**.

## CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico / farmacéutico. Kivexa® puede tomarse **CON** o **SIN** alimentos. Si tiene dificultad para tragar, puede deshacer el comprimido en un poco de agua, zumo de naranja o uva y tomarlo inmediatamente.

## QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

## CÓMO CONSERVARLO



A Tª ambiente (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

## QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: molestias gastrointestinales (diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal), mareos, dolor de cabeza, cansancio, malestar y reacciones de hipersensibilidad (VER "¡ATENCIÓN!"). Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

## ¡ATENCIÓN!



▪ **REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD A ABACAVIR:** este medicamento puede provocar una reacción de hipersensibilidad o reacción alérgica grave. Usted tiene más probabilidad de desarrollar esta reacción si tiene un gen llamado HLA-B\*5701 (pero puede sufrir dicha reacción incluso si no tiene este gen). Antes de iniciar el tratamiento, le deberían haber realizado la prueba de detección de este gen. Si sabe que tiene este gen, dígaselo a su médico antes de tomar Kivexa®. Esta reacción suele ocurrir en las primeras 6 semanas de tratamiento y **empeora al continuarlo. Consulte a su médico INMEDIATAMENTE si nota cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, erupción cutánea, enrojecimiento y/o picores, náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal, cansancio, malestar general, respiración entrecortada, dolor de garganta o tos.** Su médico valorará si estos síntomas son debidos a reacción de hipersensibilidad o a otras causas y si debe o no interrumpir el tratamiento con este medicamento. **Si su médico interrumpe el tratamiento con abacavir por sospecha de hipersensibilidad, JAMÁS vuelva a tomarlo.**

Es importante tomar Kivexa® de forma regular dado que la ingesta irregular incrementa el riesgo de reacciones de hipersensibilidad. El envase de este medicamento contiene una tarjeta informativa sobre esta reacción alérgica, que debe separar y llevar consigo. Si por cualquier motivo ha dejado de tomarlo, es importante que se ponga en contacto con su médico antes de reiniciar el tratamiento.

▪ **Comunique cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando,** pues pueden interferir con el efecto de Kivexa®.

▪ Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Se debe evitar la lactancia materna.

▪ Kivexa® contiene un colorante llamado amarillo anaranjado S (E110), que puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

## Y RECUERDE...

- Tomar esta medicación **no elimina el virus ni evita la transmisión a través de la sangre o contacto sexual.** Debe seguir tomando las precauciones apropiadas.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.** La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

## HORARIO DE MEDICACIÓN

## DOSIS

## CÓMO TOMARLO

Kivexa  
300/600 mg  
comp

Desayuno      Comida      Cena

CON o SIN  
alimentos

**NO SE QUEDE CON DUDAS.  
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

*En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.*

