

PROPRANOLOL

1 mg/mL solución jeringas 5 mL

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA




Su médico se lo ha pautado para controlar su **tensión arterial**, alteraciones en el ritmo del corazón u otras alteraciones cardiacas (angina de pecho, cardiopatía isquémica...).

CÓMO TOMARLO



Tómelo **con comidas**, intentando que sea siempre del mismo modo (el mismo régimen de comidas) e intente tomarlo siempre a la misma hora. Puede mezclarse con agua o zumos para mejorar el sabor. **Agite** bien la suspensión antes de administrarlo. Si toma **antiácidos** separar 2 horas su administración. Tome el medicamento tal y como le ha sido prescrito..

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual. Nunca tome el doble de dosis para compensar la dosis olvidada.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Puede padecer fatiga, trastornos del sueño, mareos. Si estas reacciones se vuelven severas consúlteselo a su médico.

Avisa a su médico inmediatamente si presenta dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareo severo, irregularidades en el latido cardíaco, hemorragias, extremidades frías y hormigueo o reacción alérgica.

Si aprecia cualquier efecto adverso que no hemos mencionado informe a su médico.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



Conservar en **nevera**.

Y RECUERDE...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

CÓMO LO ELABORAMOS






Propranolol100 mg
Ac. Cítrico0,4 ml
Agua conservans.....20 ml
Jarabe simplecsp 100 mL

Excipientes: este medicamento contiene sacarosa (867 mg/mL), nipagin (0,1 mg/mL) y nipasol (0,044 mg/mL)

HORARIO DE MEDICACIÓN

DOSIS

CÓMO TOMARLO

Propranolol	Desayuno	Comida	Cena	Con alimentos
				



**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

