

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA




Raltegravir es un inhibidor de la integrasa que está indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el **tratamiento de la infección por el VIH**.

CÓMO TOMARLO



Siga la pauta que le ha indicado su médico / farmacéutico. Tome los comprimidos enteros. No es recomendable masticar, machacar o partir los comprimidos. Puede tomarlos **CON** o **SIN** alimentos.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **diarrea, náuseas, mareo y cefalea**. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



- Si padece una intolerancia a ciertos azúcares, pues este medicamento contiene lactosa.
- Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.
- Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente. Se debe evitar la lactancia materna.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



A **Tª ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

Y RECUERDE...

- Tomar esta medicación **no elimina el virus ni evita la transmisión a través de la sangre o contacto sexual**. Debe seguir tomando las precauciones apropiadas.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a jueves de 8:30 a 18:30h y los viernes de 08:30 a 14:30h. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS		CÓMO TOMARLO
Isentress® 400 mg comp	Desayuno	Cena	Se puede tomar CON o SIN alimentos

**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

