

SILDENAFILO

Cápsulas

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Su médico se lo ha pautado para el tratamiento de la **hipertensión arterial pulmonar** (elevada tensión sanguínea en los vasos sanguíneos del pulmón).

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Puede padecer dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, mareos, insomnio, diarrea, enrojecimiento de cara y cuello, sudores nocturnos, tos y congestión nasal. Si estos síntomas se vuelven severos acuda a su médico.

Avisé a su médico inmediatamente si presenta cualquier reacción alérgica, fiebre, dolor de pecho, palpitaciones, alteraciones visuales (visión borrosa, alteración visión de los colores y de la percepción de la luz) y auditivas, sensación de quemazón en manos, brazos y piernas o dificultad para respirar. Si aprecia cualquier efecto adverso que no hemos mencionado informe a su médico.

CÓMO TOMARLO



Tómelo en **ayunas** (1h antes o 2h después de la última ingesta) e intente tomarlo siempre a la misma hora. Las cápsulas se pueden abrir y suspenderlas en un poco de agua. Tome el medicamento tal y como le ha sido prescrito. No suspenda la medicación ni modifique la dosis sin consultarlo con su médico

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual.

Nunca tome el doble de dosis para compensar la dosis olvidada.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



Consérvelo a **temperatura ambiente**, evitando la humedad, el calor y la luz solar directa.

Y RECUERDE...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

CÓMO LO ELABORAMOS



Composición para 100 cápsulas

Sildenafil citrato..... X mg.
Dextrinomaltoza csp.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	Desayuno	Comida	Cena	
Sildenafil				En ayunas (1 h antes de comer o 2 horas después de comer)



NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

