# SILDENAFILO
# 2.5 mg/ml Suspensión fr 50 ml

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Su médico se lo ha pautado para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (elevada tensión sanguínea en los vasos sanguíneos del pulmón).

## CÓMO TOMARLO

Tómelo en ayunas (1h antes o 2h después de la última ingesta) e intente tomarlo siempre a la misma hora. Agite bien el medicamento antes de administrarlo. Tome el medicamento tal y como le ha sido prescrito.

## QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA

Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual.
Nunca tome el doble de dosis para compensar la dosis olvidada

## QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER

Puede padecer dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, mareos, insomnio, diarrea, enrojecimiento de cara y cuello, sudores nocturnos, tos y congestión nasal. Si estos síntomas se vuelven severos acuda a su médico.
Avise a su médico inmediatamente si presenta cualquier reacción alérgica, fiebre, dolor de pecho, palpitaciones, alteraciones visuales (visión borrosa, alteración visión de los colores y de la percepción de la luz) y auditivas, sensación de quemazón en manos, brazos y piernas o dificultad para respirar. Por contener benzoato sódico como excipiente puede irritar ligeramente la piel, los ojos y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta de la piel (ictericia) en recién nacidos.

## COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...

Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

## CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO

Consérvelo a temperatura ambiente, evitando la humedad, el calor y la luz solar directa.

## Y RECUERDE...

- No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

## CÓMO LO ELABORAMOS

Sildenafilo citrato..... 350 mg
(equivalente a 250 mg de sildenafilo)
Metilcelulosa 1% gel ... .....50 mL
Jarabe simple ..... .....50 mL
Excipientes: este medicamento contiene sacarosa 444 mg/mL, benzoato sódico y metilparaben.

| HORARIO DE MEDICACIÓN | DOSIS | | | CÓMO TOMARLO |
|---|---|---|---|---|
| | Desayuno | Comida | Cena | |
| Sildenafilo | | | | En ayunas (1 h antes de comer o 2 horas después de comer) |
| | | | | |

NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.

*En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.*

Contacto farmacéuticos clínicos: 91 529 04 05
Contacto laboratorio Farmacotecnia: 91 586 85 87

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.madrid.org/hospitalgregoriomaranon/farmacia

Servicio de Farmacia
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
SaludMadrid
Comunidad de Madrid