

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Sofosbuvir es un inhibidor de la polimerasa de ARN de VHC que está indicado, en combinación con otros fármacos antivirales, en el **tratamiento de la hepatitis C crónica**.

CÓMO TOMARLO



Sovaldi® se toma una vez al día. Debe tomarlos **CON alimentos**.

Tome los comprimidos enteros. No es recomendable masticar, triturar o partir los comprimidos.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tómela tan pronto como sea posible con alimentos, a no ser que quede menos de 6 h para la siguiente dosis programada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: **fatiga o cansancio, náuseas, insomnio, dolor de cabeza**.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE REACCIONES ADVERSAS



Picor y/o sequedad en la piel: Utilice jabones neutros y cremas hidratantes/emolientes. Evite duchas demasiado calientes. Evite la exposición al sol. Beba abundantes líquidos para hidratar la piel.

Cansancio: Intente realizar sus actividades cotidianas. No conduzca ni utilice máquinas peligrosas

Náuseas y/o diarrea: Intente comer menos cantidades en más tomas durante el día. Evite las comidas muy calientes, grasas y/o con picantes. No tome café o bebidas con cafeína. Evite acostarse justo después de haber comido (espere al menos 1 hora)

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente. Se debe evitar la lactancia materna.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



A **Tª ambiente** (no superior a 30°C). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.

Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

Y RECUERDE...

- Para **evitar la transmisión a través de la sangre o contacto sexual**, debe seguir tomando las precauciones apropiadas.
- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico**. La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, anula el efecto de la medicación, favorece la aparición de resistencias y puede poner en peligro la posibilidad de tratamientos futuros.
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.
- Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
- Acuda el día y a la hora de su cita programada. También puede contactar con nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 586 7714.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
	De	Co	Ce	
Sovaldi® 400 mg comprimidos				CON alimentos

NO SE QUEDE CON DUDAS. PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

