

TACRÓLIMUS

Suspensión 0,5 mg/ml

Frasco de 50 ml

QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Este medicamento se utiliza para **prevenir el rechazo en trasplantes** de órganos.

CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



Consérvelo a **temperatura ambiente**, evitando la humedad, el calor y la luz solar directa.

QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Puede padecer vómitos, diarrea, cansancio, dolor de cabeza, temblores, insomnio, confusión, sensibilidad a la luz, aumento o disminución de la tensión arterial. Si estas reacciones se vuelven severas consúlteselo a su médico. Avise a su médico inmediatamente si presenta reacción alérgica, fiebre, infecciones, palpitaciones, menor frecuencia al orinar o dolor, trastornos en la vista u oído, erupción cutánea, color amarillo de piel y mucosas, sangrados y dificultad para respirar. Si aprecia cualquier efecto adverso que no hemos mencionado informe a su médico.

CÓMO TOMARLO



Tómelo en **ayunas** (1h antes o 2h después de la última ingesta) e intente tomarlo siempre a la misma hora.

Agite bien la suspensión antes de administrarlo.

Tome el medicamento tal y como le ha sido prescrito. No suspenda la medicación ni modifique la dosis sin consultarlo con su médico.

Si toma antiácidos separar 2 horas su administración.

COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual.

Nunca tome el doble de dosis para compensar la dosis olvidada.

CÓMO LO ELABORAMOS



Tacrolimus.....50 mg
Jarabe simple50 mL
Ora Plus50 mL

Excipientes:
este medicamento contiene lactosa (12,36 mg/ml), sacarosa (444mg/mL) nipagin (1,25mg/mL) y nipasol (0.11mg/ml).

Y RECUERDE...

- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.



HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
Tacrólimus	Desayuno 	Comida 	Cena 	En ayunas (1 h antes de comer o 2 horas después de comer)

**NO SE QUEDE CON DUDAS.
PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

