

# URSODEOXICÓLICO

## Suspensión 20 mg/ml

### Frasco de 60 ml

#### QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA



Su médico se lo ha pautado para el tratamiento de la **colestasis**.

#### CÓMO TOMARLO



Tómelo **con las comidas**.  
**Agite** bien el medicamento antes de administrarlo.  
 Tome el medicamento tal y como le ha sido prescrito. No suspenda la medicación ni modifique la dosis sin consultarlo con su médico.

#### QUÉ HACER SI SE OLVIDA UNA TOMA



Tome la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima la hora de la siguiente toma, no lo haga y continúe con su pauta habitual.  
**Nunca tome el doble** de dosis para compensar la dosis olvidada.

#### QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER



Puede presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, sensación de gases y estreñimiento.

Por contener glicerol como excipiente puede provocar, a dosis elevadas, dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

Si aprecia cualquier efecto adverso que no hemos mencionado informe a su médico.

#### COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO...



Cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta), suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

#### CÓMO CONSERVAR EL MEDICAMENTO



Consérvelo en **nevera**.

#### Y RECUERDE...

- **No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.**
- Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.
- No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

HORARIO DE MEDICACIÓN	DOSIS			CÓMO TOMARLO
Ursodeoxicólico	Desayuno 	Comida 	Cena 	Con alimentos



NO SE QUEDE CON DUDAS.  
 PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.

*En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.*

