

# Baricitinib

(Olumiant® comprimidos)



Servicio de Farmacia  
HGU Gregorio Marañón

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Olumiant® es un inhibidor Janus quinasa (JAK)1 y JAK2, que actúa disminuyendo la respuesta inflamatoria. Está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide moderada a grave en pacientes adultos con respuesta inadecuada o intolerancia a uno o más fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad.



## CÓMO ADMINISTRARLO

Olumiant® se administra por vía oral. Debe tomar un comprimido al día, siempre los comprimidos enteros, sin triturar ni partir. Se puede tomar con o sin alimentos pero siempre a la misma hora.



## QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA UNA TOMA

Si se olvida una dosis, tómelas tan pronto como sea posible y continúe con su calendario habitual. Si la dosis olvidada está más próxima a la siguiente toma, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.



## QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER

- El tratamiento con Olumiant afecta al sistema inmunitario pudiendo afectar a las defensas del paciente frente a infecciones.
- Puede propiciar una elevación de los niveles de colesterol en plasma.
- Podrían aparecer náuseas durante el inicio del tratamiento.
- No se debe utilizar durante el embarazo ni tampoco durante la lactancia materna.
- El tratamiento puede disminuir la fertilidad.



## COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO SI:

- Está tomando otros medicamentos, con o sin receta, suplementos dietéticos o productos naturales.
- Si está embarazada o lo estuviera planeando y si es madre lactante.
- Si tiene problemas de riñón.
- Si es alérgico a la soja o a los cacahuetes.



## Y RECUERDE...

- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad. Devuelva la medicación no utilizada al Servicio de Farmacia del Hospital.
- Olumiant se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarles aunque tengan síntomas similares a los suyos.
- Mantenga este medicamento y el contenedor de agujas fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Para recoger su medicación es necesario presentar la Tarjeta Sanitaria y la receta en vigor (revise que la fecha de validez sea posterior al día en curso, en caso contrario deberá acudir a su médico para que le renueve la receta).
- Nuestro horario de dispensación es de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el Servicio de Farmacia del CEIMI (C/ Francisco Silvela, 40, 6ª planta). Debe acudir a recoger su medicación el día y la hora de su cita programada. Si no pudiera acudir el día de su cita, le rogamos que llame lo antes posible al teléfono 914269366 para cambiarla. En horario de tarde puede recoger su medicación en el Servicio de Farmacia del Hospital Gregorio Marañón, de lunes a jueves de 14:30h a 18:30h.
- Para cualquier consulta sobre su tratamiento puede llamarnos de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 914269271 o escribir a la dirección de correo electrónico: [farmacia.ceimi.hgugm@salud.madrid.org](mailto:farmacia.ceimi.hgugm@salud.madrid.org)

**NO SE QUEDE CON DUDAS. PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.**

*En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.*

PARA MÁS INFORMACIÓN: **914269271**

[www.madrid.org/hospitalgregoriomaranon/farmacia](http://www.madrid.org/hospitalgregoriomaranon/farmacia)



Servicio de Farmacia  
Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón  
Comunidad de Madrid  
@farma\_gregorio