

Sarilumab (Kevzara® pluma)



Servicio de Farmacia
Centro de Enfermedades Inmunomediadas (CEIMI)
HGU Gregorio Marañón



QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Es un inhibidor de la IL-6 que actúa disminuyendo la inflamación en enfermedades como **artritis reumatoide**.

CÓMO ADMINISTRARLO

Sarilumab se debe administrar por vía subcutánea los días que le indique su médico. Saque la pluma de la nevera media hora antes de la administración. Se recomienda variar el lugar en cada administración para evitar que la piel se irrite



CÓMO CONSERVARLO

Conserve la medicación en la nevera (NUNCA en el congelador) y en su caja para protegerlo de la luz. Una vez utilizadas las plumas, tírelas al contenedor que le hemos dado en la Farmacia del Hospital. Cuando esté lleno a 2/3 de su capacidad, ciérrelo bien y entréguelo en la Farmacia para su adecuada destrucción.



QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA

Si se olvida una dosis, adminístresela tan pronto como sea posible y continúe con su calendario habitual. Si la dosis olvidada está más próxima a la siguiente administración, consulte con su médico cuándo administrarla.



QUÉ EFECTOS ADVERSOS PUEDEN APARECER

- En el punto de la piel donde ha inyectado la medicación puede aparecer eritema, urticaria, induración, dolor, hematoma, prurito o irritación. Es muy frecuente (>10%) la aparición de infecciones del tracto respiratorio superior (nasofaringitis, faringitis, laringitis y rinitis). También podrían aparecer con menor frecuencia (>1%) herpes oral, rinorrea y/o diarrea.
- Sarilumab afecta al sistema inmunitario pudiendo afectar a las defensas del paciente frente a infecciones. Antes del inicio de tratamiento deben ser descartadas infecciones latentes como tuberculosis o hepatitis B. Debe acudir a su médico o a Urgencias si presenta síntomas de infección (fiebre, tos persistente, dificultad para respirar, debilidad, pérdida de peso...) durante el tratamiento.
- Debe avisar a su médico antes de ponerse una vacuna.
- No se debe utilizar Sarilumab durante el embarazo. Se debe utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y hasta tres meses después de la última dosis y **se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con sarilumab durante la misma.**



COMUNIQUE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO SI:

- Está tomando otros medicamentos, con o sin receta, suplementos dietéticos o productos naturales.
- Tiene programada alguna operación quirúrgica o cita con su dentista.



Y RECUERDE...

- No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad. Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia
- Sarilumab se le ha prescrito a usted y no debe ser utilizado por otras personas.
- Mantenga este medicamento y el contenedor de agujas fuera de la vista y del alcance de los niños.
- Para recoger su medicación es necesario presentar **la Tarjeta Sanitaria y la receta en vigor** (revise que la fecha de validez sea posterior al día en curso, en caso contrario deberá acudir a su médico para que le renueve la receta).
- Nuestro horario de dispensación es **de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el Servicio de Farmacia del CEIMI** (C/ Francisco Silvela, 40, 6ª planta). **Debe acudir a recoger su medicación el día y la hora de su cita programada.** Si no pudiera acudir el día de su cita, le rogamos que llame lo antes posible al teléfono 914269366 para cambiarla. En horario de tarde puede recoger su medicación en el Servicio de Farmacia del Hospital Gregorio Marañón, de lunes a jueves de 14:30h a 18:30h.
- Para cualquier consulta sobre su tratamiento puede llamarnos de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 914269271 o escribir a la dirección de correo electrónico: farmacia.ceimi.hgugm@salud.madrid.org

NO SE QUEDE CON DUDAS. PREGUNTE AL FARMACÉUTICO.

En el Servicio de Farmacia trabajamos para mejorar su salud y calidad de vida.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 91 426 9271

www.madrid.org/hospitalgregoriomaranon/farmacia



@farma_gregorio