

- Puede ocurrir que salga lentamente LÍQUIDO ALREDEDOR del catéter y la piel, mojando los apósitos que tiene puestos. Por favor no retire los mojados, coloque un apósito limpio encima, realizando una leve presión. Si va en aumento o no es posible parar la salida, avísenos.
- NUNCA RETIRE el catéter por su cuenta.
- Si de FORMA ACCIDENTAL se quitara el catéter venoso, mantenga la calma y avísenos. En este caso, retire por completo todo lo que tiene insertado, incluido el sistema, los apósitos y el catéter, y presione fuertemente sobre la zona de punción con una gasa o apósito durante al menos 5 minutos, para evitar la aparición de hematomas. Si toma medicamentos antiagregantes o anticoagulantes, este tiempo debe ser mayor.

#### CUANDO AVISARNOS TELEFONICAMENTE

- Cuando sienta en la zona de inserción del catéter un DOLOR IMPORTANTE.
- Cuando no pueda controlar la salida de líquido entre el catéter y la piel, mojando los apósitos.
- Cuando se retire el catéter de forma accidental.
- Cuando SUENE LA ALARMA del dispositivo.

#### TELÉFONOS DE CONTACTO

Puede avisarnos, durante su ingreso en Hospitalización a Domicilio, los **365** días del año, de **08:00 a 20:30 horas** al teléfono **638210563**. Fuera de este horario, por favor pónganse en contacto con el **112**.

## GUÍA DE RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA EL MANEJO DE DISPOSITIVOS DE INFUSIÓN EN SU DOMICILIO



## INTRODUCCIÓN

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón le da la **BIENVENIDA** al Servicio de Hospitalización a Domicilio, dependiente del Departamento de Especialidades Médicas.

El siguiente documento tiene como finalidad informar y dar una serie de recomendaciones sobre el dispositivo de infusión que tiene usted, para la administración de fármacos por vía intravenosa, en su domicilio. Estos dispositivos se utilizan en aquellos casos en los que hay que administrarle medicamentos más de 1 vez al día, o cuando el medicamento debe pasar en más de 1 hora. *LEA DETENIDAMENTE ESTAS RECOMENDACIONES Y SI TIENE ALGUNA DUDA, POR FAVOR NO DUDE EN CONSULTARNOS.*



## VENTAJAS DE LLEVAR UN CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO

Suele ser de fácil inserción, con una técnica relativamente sencilla, exclusivamente realizada por personal sanitario cualificado. En condiciones normales no suele tener complicaciones. Es cómodo de llevar en su domicilio, lo cual le permitirá realizar actividades de una forma casi normal, si se siguen las recomendaciones que posteriormente le daremos.

Procederemos a cambiar el catéter cuando esté indicado, cosa que valorará su profesional sanitario.

## RECOMENDACIONES PARA EVITAR COMPLICACIONES

- SOLO LOS PROFESIONALES SANITARIOS CUALIFICADOS pueden manipular la vía venosa y retirar los apósitos que la cubren. Si fuese estrictamente necesario, debe realizarse con supervisión y habiendo realizado una correcta higiene de manos.
- Pídanos consejo para cuando vaya a realizar su higiene diaria y le informaremos sobre cómo EVITAR QUE SE MOJE.
- Su profesional sanitario INSPECCIONARÁ A DIARIO la situación de la vía venosa, en busca de signos que aconsejen su retirada.
- Si está tomando MEDICAMENTOS ANTIAGREGANTES O ANTICOAGULANTES debe recordárnoslo.
- Vigilar la aparición de FIEBRE (debe ponerse el termómetro las veces que le indiquemos).
- Vigilar si aparece en la zona de punción ENROJECIMIENTO de la zona o DOLOR. Si es así comuníquese a su profesional sanitario cuando vaya a visitarle, para que lo valore. Si tiene dudas cuando nosotros no estemos, por favor avísenos.
- Mantener en todo momento el dispositivo en la mochila que le facilitamos.