



Dónde encontrarnos

Hospital General Gregorio Marañón. Hospital Oncológico



¿Cómo llegar?

Dirección: Calle de Máiquez 7, 28009 Madrid, España

Metro: Línea 6 (O'Donnell) y Línea 9 (Sainz de Baranda)

Autobús: 15, 28, 30, 56 143, 156, 202, 215, N6, N8 N27

Información de contacto



HOSPITAL DE DÍA:

91-5868448

Horario:

LUNES a VIERNES. DE 9.00 – 21:00 horas

Página web:

<https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/pr/ofesionales/relacion-especialidades/oncologia-medica>

Cuidados y Mantenimiento del Reservorio Subcutáneo




Ilustración "Venous Access Port Catheter", de BruceBlaus, bajo licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0). Fuente: Wikimedia Commons.

¿QUÉ ES UN RESERVORIO SUBCUTÁNEO?

Un catéter venoso central con reservorio subcutáneo (también llamado Port-a-Cath), es un dispositivo, a través del cual se accede a una vena de gran calibre el zona del tórax.

¿POR QUÉ LLEVO UN CATÉTER?



- Administración de medicamentos de larga duración o irritantes.
- Nutrición parenteral.
- Transfusiones de hemoderivados o extracción de sangre frecuentes.

INFORMACIÓN GENERAL

¿Cómo se coloca?



- El reservorio subcutáneo se implanta bajo la piel mediante una pequeña intervención con **anestesia local** en la Unidad de Radiología Vascolar.
- Puede utilizarse inmediatamente después de su colocación.
- Durante el tratamiento, un profesional lo canalizará con una aguja especial, que se retirará al finalizar.

RECOMENDACIONES GENERALES

- **Retirada de puntos**
 - Los puntos se retirarán en su centro de salud a los 10–14 días tras su colocación.
- **Si no está en tratamiento (y no tiene aguja colocada)**
 - No precisa cuidados especiales. Puede lavarse y bañarse con normalidad.
- **Si está en tratamiento**
 - Tendrá una aguja cubierta por un apósito que debe mantenerse limpio y seco. En tratamientos continuados, la aguja se cambiará cada 7 días.
- **Actividad física**
 - Puede realizar ejercicio con normalidad, evitando golpes o riesgo de lesión en la zona del catéter.
- **Pruebas médicas**
 - Puede someterse a pruebas médicas sin contraindicaciones. Informe siempre de que es portador del catéter.


LAVADO Y SELLADO DE LOS TERMINALES DEL CÁTER

Se realizan para cuidar la parte **interna** del catéter para mantener la permeabilidad y prevenir que se obstruya.

Este procedimiento se realizará por parte de personal cualificado en:

- Centro de salud de referencia
- Hospital de Día de Oncohematología de lunes a viernes de 10 a 20 horas sin cita previa.

FRECUENCIA: antes y después de cada uso, o cada 60 días si el catéter no se usa.



Liu, Shaohong & Jiang, Luxing & Wang, Xin. (2021). Intelligent Internet of Things Medical Technology in Implantable Intravenous Infusion Port in Children with Malignant Tumors. Journal of Healthcare Engineering. 2021. 10.1155/2021/8936820.

CUÁNDO ACUDIR AL HOSPITAL Y SIGNOS DE ALARMA



- Fiebre o escalofríos.
- Enrojecimiento, dolor o inflamación en el punto de ubicación del reservorio subcutáneo.
- Úlcera o laceración de la piel que cubre el dispositivo
- Obstrucción del catéter