



Dónde encontrarnos

Hospital General Gregorio Marañón. Hospital Oncológico



¿Cómo llegar?

Dirección: Calle de Máiquez 7, 28009 Madrid, España

Metro: Línea 6 (O'Donnell) y Línea 9 (Sainz de Baranda)

Autobús: 15, 28, 30, 56 143, 156, 202, 215, N6, N8 N27




Información de contacto

HOSPITAL DE DÍA: 91 5868448

Horario: LUNES a VIERNES 9.00 – 21:00 horas

Página web: <https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/pr ofesionales/relacion-especialidades/oncologia-medica>

Autocuidado y Mantenimiento del Catéter Hickman



¿QUÉ ES UN CATÉTER HICKMAN?

Es un tubo delgado y flexible que se coloca en una vena grande del cuello. Una parte del catéter queda dentro del cuerpo y la otra sale por la piel, cerca del pecho.

¿POR QUÉ LLEVO UN CATÉTER?



- Candidato a TPH (trasplante de médula) y otros procesos que requieran aféresis
- Administración de medicamentos de larga duración, nutrición parenteral, transfusiones de hemoderivados o extracción de sangre frecuentes.

CUIDADOS EXTERNOS DEL CATÉTER EN EL DOMICILIO

Se realizan para cuidar la parte **externa** del catéter

CUÁNDO	<ul style="list-style-type: none">▪ Si el apósito es de gasa, se cambia cada 2 días.▪ Si el apósito es transparente, se cambia cada 7 días. Colocar apósito transparente (cubriendo el punto de salida con el gel).▪ Siempre que el apósito esté sucio o mojado.
---------------	--

MATERIAL NECESARIO	<ul style="list-style-type: none">▪ Gasas estériles.▪ Apósito transparente con gel de clorhexidina (proporcionado por su centro hospitalario)▪ Antiséptico recomendado: clorhexidina alcohólica al 2% / povidona yodada
---------------------------	---

¿CÓMO SE HACE?	<ol style="list-style-type: none">1. Higiene de manos previa a la cura2. Retirar apósito desde la parte inferior, y luego tirar hacia arriba.3. Lavado del catéter (punto de inserción y tubos) con agua y jabón en la ducha. NUNCA BAÑO. NO uso de ESPONJAS.4. Secar punto de inserción con toalla limpia, de uso exclusivo de esta zona.5. Desinfectar el punto de inserción con gasas impregnadas en antiséptico.6. Dejar secar 30 segundos.7. Colocar apósito.8. Registrar la fecha de cambio.
-----------------------	--



LAVADO Y SELLADO DE LOS TERMINALES DEL CÁTETER

Se realizan para cuidar la parte **interna** del catéter para mantener la permeabilidad y prevenir que se obstruya.

<p>Este procedimiento se realizará por parte de personal cualificado en:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Centro de salud de referencia▪ Hospital de Día de Oncohematología de lunes a viernes de 10 a 20 horas sin cita previa. <p>FRECUENCIA: cada 7 días si el catéter no se usa antes.</p>
--

CUIDADOS ESPECÍFICOS

<ul style="list-style-type: none">▪ Retirada de puntos:<ul style="list-style-type: none">○ Punto ojal y cuello: a los 10 -14 días tras la colocación del catéter.○ Punto de negro de seda: a los 30 días tras colocación el catéter y tras comprobar su correcta fijación.▪ Prohibido sumergirse en piscinas, mar, ríos, etc.▪ Sólo se cambian tapones si de forma accidental se cayeran. Mantener “clamps” cerrados.
--

CUÁNDO ACUDIR AL HOSPITAL Y SIGNOS DE ALARMA

<ul style="list-style-type: none">▪ Fiebre o escalofríos.▪ Enrojecimiento, dolor o inflamación en el punto de inserción del catéter o su recorrido.▪ Salida accidental o rotura del catéter.
--

