

FOLLETO INFORMATIVO PARA PACIENTES QUE HAN RECIBIDO UNA TRANSFUSION DE PLAQUETAS EN DOMICILIO

- Usted ha recibido una transfusión de plaquetas en domicilio.
- Si bien la frecuencia de reacciones transfusionales es muy baja, y la mayoría de ellas ocurre durante la infusión o inmediatamente después de la misma, algunas reacciones ocurren en forma diferida.
- Por este motivo, su cuidador principal deberá permanecer con usted las siguientes 6 horas posteriores a la transfusión.
- La enfermera de la Unidad de Hematología Domiciliaria (UHD) le ha dejado la siguiente medicación:

***Paracetamol** 1 gramo, 2 comprimidos

***Dexclorfeniramina** 2 miligramos, 2 comprimidos

***Prednisona** 30 miligramos, 2 comprimidos

- En caso de presentar una reacción diferida, puede contactar con el personal sanitario a través de los teléfonos:
 - 91-5868152 Control de enfermería Unidad de Trasplante. 24 horas
 - 91-5868121 Control de enfermería de Planta. 24 horas
 - 91-5868120 Hematólogo. Lunes a viernes, en turno de mañana
 - 91-5868443 Hematólogo. Lunes a viernes, en turno de mañana

Se le indicará lo siguiente:

- ✓ En caso de **reacción cutánea leve**: tomará Dexclorfeniramina 2 miligramos (1 comprimido) y Prednisona 30 miligramos (1 comprimido). En caso de no resolverse en 1 hora, deberá acudir al hospital para valoración en la cama O201 del Hospital Oncológico.
- ✓ **Febrícula**: en caso de febrícula por debajo de 37,8° C, el paciente tomará Paracetamol 1 gramo (1 comprimido). En caso de no resolverse en 1 hora, deberá acudir al hospital para valoración en la cama O201 del Hospital Oncológico.
- ✓ **Fiebre**: en caso de presentar temperatura por encima de 38° C, el paciente acudirá de forma urgente al hospital para valoración en la cama O201 del Hospital Oncológico.
- ✓ En caso de **síntomas respiratorios**: el paciente contactará de forma urgente con el servicio de emergencias médicas (112) para valoración.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN